

ФИО**Пол:** Жен**Возраст:** 43 года

ИНЗ: 999999999

Дата взятия образца: 22.04.2024

Дата поступления образца: 22.04.2024

Врач: 22.04.2024

Дата печати результата: 22.04.2024

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АТ к деамид.пептидам глиаина, IgG	12.00*	Ед/мл	< 10	< 10 Ед/мл - отрицательно >= 10 Ед/мл - положительно Тест-система: Anti-DGP IgG, ORGENTEC

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:

Антитела к деамидированным пептидам глиаина (ДПГ) класса IgG являются чувствительным (92-95%) и специфичным (95-98%) серологическим маркером целиакии. ДПГ пептиды представляют собой короткие иммунодоминантные последовательности альфа-глиаина злаков, которые непосредственно участвуют в поражении слизистой кишечника при целиакии. Обычно антитела к ДПГ отмечаются вместе с антителами к тканевой трансаминазе (ТТГ), однако, у детей до 5 лет антитела к ДПГ могут встречаться изолированно (рекомендации ESPAGHN 2012). Антитела к ДПГ отмечаются у 60% пациентов с герпетиформным дерматитом. После назначения безглютеновой диеты титры антител падают ниже порога детекции в течении 3-9 месяцев

Отсутствие антител к деамидированным пептидам глиаина класса IgG в сочетании с антителами к эндомизию и/или трансаминазе исключает диагноз целиакии, в том числе целиакии ассоциированной с селективным дефицитом IgA при условии, что в момент обследования пациент не находился на безглютеновой диете, т.е. получал обычную пищу богатую глиадином.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача