

Подготовка к исследованиям

Колоноскопия

Перед проведением исследования необходимо соблюдать обязательную подготовку.
Перед проведением исследования сообщите врачу о приеме антикоагулянтов.*
Прием таких препаратов необходимо отменить за 5 суток до исследования.

В течение 3-х дней требуется соблюдение особой диеты:

⊗ Исключить из употребления

- черный хлеб
- свежие овощи и фрукты
- зелень
- грибы
- бобовые
- ягоды
- злаковые
- семечки и орехи
- варенье с косточками
- виноград
- киви

☑ Рекомендуется употреблять в пищу:

- бульон
- манная каша
- яйцо
- отварное мясо
- курятина
- вареная колбаса
- рыба
- сыр
- масло
- белый хлеб
- кисломолочные продукты, кроме творога

Накануне исследования можно употреблять в пищу только бульоны, кисели, соки без мякоти.

Подготовка препаратом Фортранс

Одноэтапная подготовка (если исследование проводится в первой половине дня)

Накануне исследования последний прием пищи не позднее 15 часов. С 16 до 20 часов необходимо принять препарат Фортранс. Содержимое 4-х пакетов препарата растворить в 4-х литрах воды комнатной температуры. Принимать по 1 стакану каждые 15 минут.

Двухэтапная подготовка (если исследование проводится во второй половине дня)

В день перед исследованием последний прием пищи в 16 часов. С 18 до 20 часов необходимо принять препарат Фортранс. Содержимое 2-х пакетов препарата растворить в 2-х литрах воды комнатной температуры. Принимать по 1 стакану каждые 15 минут.

В день исследования прием Фортранса повторить: с 8 до 10 часов содержимое 2-х пакетов препарата растворить в 2-х литрах воды комнатной температуры. Принимать по 1 стакану каждые 15 минут.

В день приема перед исследованием за 2-3 часа рекомендуется выполнить клизму.

Если не планируется выполнение колоноскопии с седацией (во сне), можно в день исследования съесть легкий завтрак (яйцо, каша, хлеб, кофе или чай) за 2 часа до исследования.

⚠ Если планируется выполнение седации – от пищи и любой жидкости необходимо воздержаться в течение 8 часов до исследования.

Подготовка препаратом Эзиклен

В день перед исследованием завтрак возможен не позднее 9 утра и может включать в себя отварное мясо и птицу, нежирные сорта рыбы, нежирные кисломолочные продукты, яйца. В обед и ужин можно пить только прозрачные бульоны, чай и кофе без молока, соки без мякоти, неокрашенные безалкогольные напитки, воду. Для приготовления первого литра готового раствора содержимое 1 саше А и 1 саше В растворяют в небольшом количестве воды и доводят до 1 л водой. Приготовленный раствор следует выпить в течение 1 ч. Процедура разведения второго литра препарата аналогична. Первый литр препарата принимается с 19 до 20 ч. Второй литр препарата принимается с 21 до 22 часов. После каждого принятого литра препарата рекомендуется выпить по 500 мл воды, чая, кофе, бульона или сока без мякоти.

⚠ Если планируется выполнение седации – от пищи и любой жидкости необходимо воздержаться в течение 8 часов до исследования.

⚠ Противопоказания

- острая и подострая стадии инфаркта миокарда
- перфорация кишечника
- воспалительные заболевания органов брюшной полости с явлениями перитонита
- молниеносная форма ишемического колита
- острая сердечно-сосудистая и/или дыхательная недостаточность

*Антикоагулянты – лекарственные препараты, снижающие свертываемость крови (обычно применяются для профилактики тромбообразования).



м. Каширская, Каширское шоссе, д. 68, к. 2



м. Аэропорт, пр-т Ленинградский, д. 60А



м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39

8 (495) 933-83-03

invitro.ru