

Таблица 2. Многовариантные модели предикторов нарастания внутримозгового кровоизлияния > 6 мл

	Сравнение	Отношение шансов (95% ДИ)	Значение p
Пациенты, не принимавшие антикоагулянтную терапию при появлении первых симптомов *			
Время от появления первых симптомов до исходной визуализации, ч †	3·4 vs 1·2	0·65 (0·51–0·82)	0·0003
Объем внутримозгового кровоизлияния при исходной визуализации, мл †	28 vs 7	4·73 (3·81–5·87)	<0·0001
Антиагрегантная терапия при появлении первых симптомов	Да vs нет	1·38 (1·06–1·79)	0·016
Пациенты из когорт, включающих по крайней мере некоторых пациентов, принимавших антикоагулянтную терапию при появлении первых симптомов ‡			
Время от появления первых симптомов до исходной визуализации, ч †	3·5 vs 1·2	0·59 (0·42–0·82)	0·0021
Объем внутримозгового кровоизлияния при исходной визуализации, мл †	29 vs 7	4·81 (3·82–6·05)	<0·0001
Антиагрегантная терапия при появлении первых симптомов	Да vs нет	1·36 (1·04–1·78)	0·023
Антикоагулянтная терапия при появлении первых симптомов	Да vs нет	2·91 (1·97–4·26)	<0·0001

* Данные были рассчитаны на основе 2534 пациентов из 18 когорт.

† Отношения шансов времени от появления первых симптомов до исходной визуализации и объема внутримозгового кровоизлияния на исходной визуализации справедливы для верхнего квартиля по сравнению с нижним квартилем.

‡ Данные были рассчитаны на основе 2381 пациента из десяти когорт.