

Таблица 3. Многовариантные модели предикторов нарастания внутримозгового кровоизлияния > 6 мл у пациентов с оценкой наличия очага кровоизлияния при КТ-ангиографии, данными по антиагрегантной терапии и данными по применению антикоагулянтной терапии при появлении первых симптомов

	Сравнение	Четыре предиктора		Четыре предиктора и наличие очага при КТ ангиографии	
		Отношение шансов (95% ДИ)	Значение р	Отношение шансов (95% ДИ)	Значение р
Время от появления первых симптомов до исходной визуализации, ч*	5·1 vs 1·5	0·50 (0·36–0·70)	<0·0001	0·61 (0·44–0·84)	0·0030
Объем внутримозгового кровоизлияния при исходной визуализации, мл *	33 vs 6	7·18 (4·46–11·56)	<0·0001	5·35 (3·25–8·81)	<0·0001
Антиагрегантная терапия при появлении первых симптомов	Да vs нет	1·68 (1·06–2·66)	0·026	1·45 (0·89–2·35)	0·13
Антикоагулянтная терапия при появлении первых симптомов	Да vs нет	3·48 (1·96–6·16)	<0·0001	2·80 (1·53–5·10)	0·0008
Наличие очага кровоизлияния при КТ ангиографии	Наличие vs отсутствие	..	..	4·46 (2·95–6·75)	<0·0001

Данные были рассчитаны на основании 837 пациентов из шести когорт.

* Отношения шансов для времени от появления первых симптомов до исходной визуализации и объема внутримозгового кровоизлияния на исходной визуализации для верхнего квартиля по сравнению с нижним квартилем.