

Таблица 2. Характеристики пациентов с удовлетворительным и неудовлетворительным результатом лечения

	Клиническое излечение (n = 229)	Неудовлетворительный исход лечения (n = 20)	P - значение
Возраст (лет)	60 (45–73)	56 (46–71)	0,412
Мужской пол	94 (41)	7 (35)	0,597
Урологический анамнез			
Установка уретрального катетера	7 (3)	0	0,428
Патология мочевыводящих путей ^a	71 (31)	4 (20)	0,304
Рецидивирующая ИМП ^b	50 (22)	7 (35)	0,191
Коморбидность			
Сахарный диабет	32 (14)	1 (5)	0,256
Онкопатология	16 (7)	1 (5)	0,735
Сердечная недостаточность	21 (9)	0	0,157
Сердечно- сосудистые заболевания	12 (5)	1 (5)	0,963
Хроническая почечная недостаточность	8 (3)	1 (5)	0,729
ХОБЛ	27 (11)	2 (10)	0,899
Иммуносупрессия	14 (6)	1 (5)	0,841
На момент поступления			
В отделение неотложной помощи	160 (70)	15 (75)	0,630
Предшествующий	71 (31)	2 (10)	0,048

	Клиническое излечение (n = 229)	Неудовлетворительный исход лечения (n = 20)	P - значение
прием антибиотиков			
Продолжительность лихорадки, часы	36 (18–72)	48 (24–120)	0,279
Дизурия	175/224 (78)	13/19 (68)	0,332
Боль в боку	142/225 (63)	17 (85)	0,049
Боль над лобком	116/222 (52)	11 (55)	0,814
Боль в промежности	11/222 (5)	0/19 (0)	0,321
Систолическое АД, мм рт. ст.	130 (116–146)	130 (115–150)	0,753
Диастолическое АД, мм рт. ст.	74 (63–85)	72 (68–83)	0,585
Сердечные сокращения, ударов в минуту	93 (80–107)	96 (78–110)	0,695
Посев мочи			
Положительный посев мочи	158 (69)	13 (65)	0,712
<i>Escherichia coli</i>	133/158 (84)	10/13 (77)	0,497
Положительный посев крови	42/220 (19)	3 (15)	0,654
Положительный посев мочи и/или крови	169 (74)	14 (70)	0,712
Лечение			
Короткий курс антибиотика (7 дней)	82 (36)	10 (50)	0,207
Количество дней приема АБ, средн., (СО)	11 (3,3)	11 (3,5)	0,252

	Клиническое излечение (<i>n</i> = 229)	Неудовлетворительный исход лечения (<i>n</i> = 20)	<i>P</i> - значение
Ципрофлоксацин	208 (91)	18 (90)	0,902
Амоксициллин (± клавулоновая кислота)	11 (5)	2 (10)	0,316
ТМП/СМК	5 (2)	0	0,504
Другое ^c	5 (2)	0	0,504
Первичная внутривенная дозировка АБ	135 (59)	12 (60)	0,927
Рандомизировано	155 (68)	10 (50)	0,109
Амбулаторное лечение	89 (39)	7 (35)	0,733

Данные представлены в виде числа (%) или медианы (МКИ).

АД - артериальное давление, АБ - антибиотики, ТМП/СМК - триметоприм-сульфаметоксазол.

^aлюбые функциональные или анатомические нарушения мочевых путей, кроме катетеризации;

^b≥3 случаев ИМП за последние 12 месяцев или ≥ 2 случаев ИМП за последние 6 месяцев;

^cЦефуроксим в/в *n* = 2, меропенем в/в *n* = 1, моксифлоксацин *n* = 1, флуоклоксациллин *n* = 1.