

Таблица 2. Многопараметрическая скорректированная ассоциация HOMA-IR и ранее указанных факторов с инсулинорезистентностью в когортном исследовании пациентов с хронической почечной недостаточностью (CRIC) без диабета на момент включения в исследование ($N = 1806$)

Демографические / клинические переменные	β	P
Возраст, лет	0,005	0,001
Некурящие	0,13	0,002
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.	–0,001	0,28
Физическая активность ^a	–0,0001	0,43
Антропометрические переменные		
Индекс массы тела, кг/м ²	0,02	Менее 0,001
Окружность талии, см	0,01	Менее 0,001
Безжировая масса тела, кг	–0,003	0,15
Прием лекарств		
Отсутствие приема ИАПФ или БРА	–0,05	0,11
Лабораторные показатели		
рСКФ, мл/мин /1,73 м ²	–0,00001	0,99
Гемоглобин, ммоль/л	0,04	Ниже 0,001
ЛПНП, ммоль/л	–0,002	Ниже 0,001
ЛПВП, ммоль/л	–0,003	0,001
(log) Триглицериды, ммоль/л	0,30	Ниже 0,001
(log) Высокочувствительный СРБ, нмоль/л	0,04	0,03

^aФизическая активность, измеренная как общее количество зарегистрированных метаболических эквивалентов (ед. изм. нагрузки при нагрузочном тестировании на тредмиле, METS — Metabolic Equivalents) в течение одной недели.

Модель также скорректирована с учетом пола, расы, этнической принадлежности и образования.

НОМА-IR — гомеостатическая модель для оценки инсулинорезистентности; ИАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина, рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации, ЛПНП — липопротеины низкой плотности, ЛПВП — липопротеины высокой плотности, СРБ — С-реактивный белок.