

Таблица 1. Исходные характеристики 249 пациентов с инфекцией мочевых путей с фебрильной сотсавляющей

	<b>Общее количество пациентов (n = 249)</b>
Возраст (лет)	60 (45–73)
Мужской пол	101 (41)
Урологический анамнез	
Установка уретрального катетера	7 (3)
Патология мочевыводящих путей <sup>a</sup>	75 (30)
Рецидивирующая ИМП <sup>b</sup>	57 (23)
Коморбидность	
Сахарный диабет	33 (13)
Онкопатология	17 (7)
Сердечная недостаточность	21 (8)
Сердечно-сосудистые заболевания	13 (5)
Хроническая почечная недостаточность	9 (4)
ХОБЛ	27 (11)
Иммуносупрессия	15 (6)
На момент поступления	
В отделение неотложной помощи	175 (70)
Предшествующий прием антибиотиков	73 (29)
Продолжительность лихорадки, часы	36 (19–72)
Дизурия	188/243 (77)
Боль в боку	159/245 (65)
Боль над лобком	127/242 (52)

	<b>Общее количество пациентов (n = 249)</b>
Боль в промежности	11/241 (5)
Систолическое АД, мм рт. ст.	130 (116–146)

Данные представлены в виде числа (%) или медианы (МКИ)

*АД* - артериальное давление, *АБ* - антибиотики, *ТМП/СМК* - триметоприм-сульфаметоксазол.

<sup>a</sup>любые функциональные или анатомические нарушения мочевых путей, кроме катетеризации;

<sup>b</sup> $\geq 3$  случаев ИМП за последние 12 месяцев или  $\geq 2$  случаев ИМП за последние 6 месяцев.