

Таблица 1. Влияние возраста и сопутствующих заболеваний на показатели летальности при пневмококковой инфекции

Возрастной состав популяции	Сопутствующие заболевания	Показатели летальности	Ссылка
18 лет – 64 года	Сообщений нет ^a	19%	(67)
64 года и старше	Диабет 2 типа Хроническая сердечная недостаточность Застойная сердечная недостаточность Хроническая почечная недостаточность	45% 33% 20% 60%	(68) (68) (68) (68)
65 лет и старше	Сообщений нет	20%	(66)
Старше 65 лет	СПИД Системная красная волчанка Хроническая болезнь легких Хроническая болезнь печени Застойная сердечная недостаточность Хроническая недостаточность почек	69% ^b Все сопутствующие заболевания	(69) (69) (69) (69) (69) (69)
80 лет	Сообщений нет	71%	(70)
85 лет и старше	Сообщений нет	38%	(67)
78-100 лет	Сообщений нет	27%	(71)
86 лет – 104 года	Сообщений нет	20%	(72)

^a В этом исследовании анализировалась вся популяция, включая здоровых лиц и лиц с сопутствующими заболеваниями. Показатели летальности не указаны в связи с наличием различных сопутствующих заболеваний.

^b В этом исследовании показатели летальности подсчитывались для всей популяции (для здоровых лиц и лиц с перечисленными сопутствующими заболеваниями)/