

Таблица 1 Демографические и клинические характеристики людей без подагры и с подагрой

	Отсутствие подагры (N = 1 623 304)	Подагра (N = 76 309)
Средний возраст, (CO)	75,3 (7,6)	74,9 (7,0)
Пол, N (%)		
Мужской	672 755 (41,4%)	44 740 (58,6%)
Женский	950 549 (58,6%)	31 569 (41,4%)
Расовая принадлежность, N (%)		
Европеоидная	1 403 749 (86,5%)	63 434 (83,1%)
Негроидная	128 197 (7,9%)	8585 (11,3%)
Другая	91 358 (5,6%)	4290 (5,6%)
Средний показатель индекса коморбидности Чарлсона–Романо ² (CO)	1,5 (2,5)	2,0 (2,4)
Показатель индекса коморбидности Чарлсона–Романо, N (%)		
0	883 689 (54,4%)	28 407 (37,2%)
1	163 358 (10,1%)	10 658 (14,0%)
≥2	576 257 (35,5%)	37 246 (48,8%)
Выборка сопутствующих заболеваний, входящих в оценку по индексу коморбидности Чарлсона–Романо		
Инфаркт миокарда	59 625 (3,7%)	4450 (5,8%)
Сердечная недостаточность	172 489 (10,6%)	14 630 (19,2%)
Заболевания периферических сосудов	148 616 (9,2%)	10 082 (13,2%)
Цереброваскулярная болезнь	152 599 (9,4%)	9046 (11,9%)
Деменция	74 277 (4,6%)	1926 (2,5%)
Хроническая болезнь легких	245 086 (15,1%)	15 297 (20,0%)
Заболевания соединительной ткани	43 359 (2,7%)	3063 (4,0%)
Пептическая язва	29 277 (1,8%)	1923 (2,5%)
Болезнь печени легкой степени	7583 (0,5%)	533 (0,7%)
Диабет	280 819 (17,3%)	21 459 (28,1%)

	Отсутствие подагры (N = 1 623 304)	Подагра (N = 76 309)
Диабет с поражением органов-мишеней	77 421 (4,8%)	5906 (7,7%)
Гемиплегия	13 144 (0,8%)	634 (0,8%)
Артериальная гипертензия	752 833 (46,4%)	53 555 (70,2%)
Гиперлипидемия	545 421 (33,6%)	37 898 (49,7%)
Ишемическая болезнь сердца	267 429 (16,5%)	21 123 (27,7%)
Ожирение	30 761 (1,9%)	3285 (4,3%)