

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов

	Группа активного препарата n = 30	Группа плацебо n = 28	p- значение
Возраст (лет)	68,1 ± 5,9	69,2 ± 6,3	0,35
Мужчины/женщины	12/18	11/17	0,45
Длительность ринита (лет)	4,4 ± 1,4	6,9 ± 2,1	0,23
Число пациентов с астмой	0	0	–
Число пациентов с экземой	2	1	0,21
Число курильщиков	6	5	0,67
Число пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца	8	10	0,17
Число пациентов с артериальной гипертензией	12	9	0,22
Число пациентов с диабетом	4	5	0,39
Средняя оценка назальных симптомов за неделю	3,21 ± 0,93	3,11 ± 0,54	0,18
Средняя оценка неназальных симптомов за неделю	3,64 ± 0,55	3,21 ± 0,9	0,11
Средняя оценка по шкале необходимости приема препаратов за неделю	0,45 ± 0,17	0,51 ± 0,09	0,59
Общий IgE	187,43 ± 64,01	201,9 ± 83,22	0,19
Специфические IgE к Der p (кЕ/л)	24,9 ± 10,11	27,31 ± 13,9	0,4
Специфические IgE к Der f (кЕ/л)	17,45 ± 8,31	15,9 ± 10,5	0,19