

	Многофакторный анализ (модель 1)*		Многофакторный анализ (модель 2)*		Многофакторный анализ (модель 3)*	
	ОР (95% ДИ)	P-значение	ОР (95% ДИ)	P-значение	ОР (95% ДИ)	P-значение
0	Н/п		Реф.		Н/п	
1			2,33 (2,30, 2,37)	< 0,0001		
≥ 2			2,99 (2,96, 3,02)	< 0,0001		
Подагра	3,05 (2,99, 3,10)	< 0,0001	2,96 (2,91, 3,01)	< 0,0001	2,59 (2,54, 2,63)	< 0,0001

* В модели 1 в качестве непрерывной переменной использовали значение индекса Чарлсона–Романо, в модели 2 – категорию значения индекса Чарлсона–Романо, в модели 3 – каждое из 17 сопутствующих заболеваний, по которым подсчитывается индекс Чарлсона–Романо. Кроме того, во всех моделях учитывались препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (статины, бета-блокаторы, диуретики, ингибиторы АПФ) и уратснижающие препараты для лечения подагры (аллопуринол, фебуксостат).

Н/п - не применимо, ОР - отношение рисков, ДИ - доверительный интервал, Реф. - референтная категория.

Жирным шрифтом выделены статистически значимые показатели с P-значением < 0,05.