

Таблица 3. Корреляция HOMA-IR и новых факторов с многопараметрической корректировкой для участников когортного исследования хронической почечной недостаточности (CRIC) без диабета на момент включения в исследование (N = 1706)

Клинические переменные	β	P
Отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе	0,01	0,86
Отсутствие приема лекарств		
Статины	0,11	0,14
Нестатиновые гиполипидемические препараты	−0,16	0,03
Лабораторные показатели		
Протеинурия, г/сут		
Ниже 0,10	−0,07	0,20
От 0,2 до 0,5	−0,07	0,20
От 0,5 до 1,5	−0,002	0,97
Гемоглобин A1c, %	0,20	Ниже 0,001
Мочевая кислота, мкмоль/л	0,03	Ниже 0,001
(log) FGF-23, относительные единицы (RU)/мл	0,04	0,10
Сывороточный альбумин, г/л	0,12	0,001

Модель скорректирована с учетом возраста, пола, расы, этнической принадлежности и образования, статуса курильщика, систолического артериального давления, физической активности, безжировой массы тела, индекса массы тела, окружности талии, приема ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов рецепторов ангиотензина; расчетной скорости клубочковой фильтрации, уровней гемоглобина, липопротеинов высокой и низкой плотности, триглицеридов, С-реактивного белка.