

Таблица 3. Связь между подагрой и новыми случаями возникновения ХБП по результатам анализа заранее определенных подгрупп по расовой принадлежности, полу и возрасту

	Многофакторный анализ (модель 1)*		Многофакторный анализ (модель 1)*		Многофакторный анализ (модель 1)*	
	ОР (95% ДИ)	P-значение	ОР (95% ДИ)	P-значение	ОР (95% ДИ)	P-значение
	Негроидная		Европеоидная		Другая расовая принадлежность	
Подагра	3,06 (2,93, 3,21)	< 0,0001	3,04 (2,98, 3,10)	< 0,0001	3,13 (2,91, 3,37)	< 0,0001
	Женский		Мужской			
Подагра	3,18 (3,09, 3,26)	< 0,0001	2,96 (2,90, 3,03)	< 0,0001		
	65–75 лет		75–85 лет		> 85 лет	
Подагра	3,34 (3,26, 3,43)	< 0,0001	2,87 (2,80, 2,95)	< 0,0001	2,66 (2,54, 2,80)	< 0,0001
	Отсутствие артериальной гипертензии		Артериальная гипертензия			
Подагра	4,29 (4,15, 4,44)	< 0,0001	2,38 (2,33, 2,43)	< 0,0001		
	Отсутствие диабета		Диабет			
Подагра	3,47 (3,40, 3,54)	< 0,0001	2,24 (2,18, 2,30)	< 0,0001		
	Отсутствие ИБС		ИБС			
Подагра	3,32 (3,25, 3,39)	< 0,0001	2,38 (2,31, 2,46)	< 0,0001		

P-значения различий между подгруппами:

Связь между расовой принадлежностью* и подагрой, p-значение 0,004

Связь между полом* и подагрой, p -значение $< 0,0001$

Связь между возрастом* и подагрой, p -значение $< 0,0001$

Связь между артериальной гипертензией* и подагрой, p -значение $< 0,0001$

Связь между диабетом* и подагрой, p -значение $< 0,0001$

Связь между ИБС* и подагрой, p -значение $< 0,0001$

ОР - отношение рисков, ДИ - доверительный интервал

Статистически значимые показатели отношения рисков с p -значением $< 0,05$ выделены жирным шрифтом.