

Таблица 5. Изменение многовариантно-скорректированных отношений риска комбинированных конечных точек показателей почечных и атеросклеротических сердечно-сосудистых событий и общей смертности, приходящееся на каждую единицу увеличения SD НОМА-IR и других маркеров углеводного обмена, среди участников CRIC без диабета на момент включения в исследование

	Модель 1 ^б			Модель 2 ^б			Модель 3 ^б	
	ОР ^а	95% ДИ		ОР ^а	95% ДИ		щР*	95% ДИ
Событие: комбинированная конечная точка показателей почечных событий (ТСПН/снижение рСКФ вдвое)								
НОМА-IR	0,97	0,89–1,07		1,01	0,90–1,12		1,01	0,90–1,14
Глюкоза	0,93	0,85–1,03		0,94	0,85–1,04		0,88	0,79–0,98
НbA1c	0,98	0,89–1,07		1,00	0,90–1,10		0,94	0,85–1,04
С-пептид	1,32	1,20–1,44		1,16	1,03–1,31		1,02	0,90–1,17
Событие: комбинированная конечная точка показателей атеросклеротических сердечно-сосудистых событий (инфаркт миокарда/атеросклероз периферических артерий/инсульт)								
НОМА-IR	1,04	0,91–1,19		1,04	0,89–1,22		1,00	0,85–1,19
Глюкоза	1,04	0,91–1,20		1,06	0,91–1,23		1,05	0,90–1,23
НbA1c	1,22	1,07–1,39		1,22	1,06–1,40		1,16	1,00–1,34
С-пептид	1,17	1,02–1,34		1,07	0,89–1,29		1,02	0,84–1,24
Событие: смертность от всех причин								
НОМА-IR	0,94	0,85–1,05		1,01	0,89–1,14		0,98	0,86–1,12
Глюкоза	0,96	0,87–1,07		0,99	0,89–1,11		0,99	0,88–1,11
НbA1c	1,03	0,93–		1,05	0,94–		0,99	0,88–

		1,14			1,17			1,10
С-пептид	1,18	1,06– 1,31		1,16	1,01– 1,33		1,09	0,94– 1,27

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации, ТСПН — терминальная стадия почечной недостаточности, HbA1c — гликозилированный гемоглобин, НОМА-IR — гомеостатическая модель оценки инсулинорезистентности, ОР — отношение рисков.

^aНа единицу увеличения стандартного отклонения.

Модель 1 включает корректировку с учетом возраста, пола, расы, этнической принадлежности, уровня образования и клинического центра.

Модель 2 включает корректировку переменных модели 1 с учетом индекса массы тела, окружности талии, статуса курильщика, систолического АД, приема ИАПФ/БРА, уровней ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов, гемоглобина, высокочувствительного СРБ, безжировой массы тела, рСКФ, физической активности.

Модель 3 включает корректировку переменных модели 2 с учетом приема статинов, других гиполипидемических препаратов, наличия сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, уровней белка в суточной порции мочи, FGF-23, мочевой кислоты, сывороточного альбумина.

^bРазмеры выборки: модель 1 ($N = 1882$), модель 2 ($N = 1806$), модель 3 ($N = 1706$).