

Таблица 6. Изменение характеристик пациента: сравнение суточного мониторингирования ЭКГ по Холтеру до и после диетического вмешательства

	Экспериментальная группа ($n = 29$) $\bar{x} \pm SD$			Контрольная группа ($n = 25$) $\bar{x} \pm SD$		
	Начальная точка	6-я неделя	Разность	Начальная точка	6-я неделя	Разность
ЖЭС > 500 /24 ч.	2486 $\pm$ 2133	2316 $\pm$ 3232	– 170 $\pm$ 2469	5717 $\pm$ 7662	2649 $\pm$ 3287	– 3068 $\pm$ 5259 ^{##}
НЖ тахикардия (ЧСС > 100/мин.)	37,3 $\pm$ 66,1	23,7 $\pm$ 46,0	– 13,6 $\pm$ 67,4	52,2 $\pm$ 67,3	39,9 $\pm$ 103,8	– 12,4 $\pm$ 96,9
НЖЭС > 200/24 ч.	2000 $\pm$ 1874	2204 $\pm$ 1474	204 $\pm$ 1541	1025 $\pm$ 406	585 $\pm$ 786	– 440 $\pm$ 427
НЖЭС < 200/24 ч. с симптомами	20,5 $\pm$ 32,9	21,3 $\pm$ 46,9	0,85 $\pm$ 55,83	39,2 $\pm$ 36,4*	107,7 $\pm$ 298,0	68,6 $\pm$ 269,7
ЧСС (уд./мин.)	71,4 $\pm$ 12,5	68,4 $\pm$ 10,8	– 3,0 $\pm$ 7,9 [#]	72,9 $\pm$ 12,7	70,3 $\pm$ 13,2	– 2,6 $\pm$ 9,3

Сокращения: ЖЭС – желудочковые экстрасистолы, НЖ – наджелудочковая, НЖЭС – наджелудочковые экстрасистолы, ЧСС – частота сердечных сокращений.

*# $p < 0,05$ внутри группы, ## $p < 0,01$ внутри группы, * $p < 0,05$ между группами.*