

Лекарственные препараты, часто вызывающие гинекомастию*

Категория	Лекарственные препараты
Антиандрогенные препараты (подавляющие синтез или активность андрогенов)	Ципротерон (антиандроген, используемый для лечения рака простаты, а также трансгендерными женщинами) Дутастерид, финастерид (ингибиторы 5-альфа-редуктазы) Гозерелин, гистрелин (в РФ не зарегистрирован) Лейпрорелин, трипторелин (агонисты ГнВГ) Дегареликс, релуголикс (в РФ не зарегистрирован) (антагонисты ГнВГ) Флутамид, бикалутамид, энзалутамид, абиратерон, даролутамид, апалутамид, нилутамид (пероральные антиандрогены, применяемые для лечения рака простаты)
Антибактериальные препараты	Эфавиренз Этионамид Изониазид Кетоконазол Метронидазол
Противоопухолевые препараты	Алкилирующие агенты Иматиниб ГнВГ (агонисты и антагонисты) Метотрексат Алкалоиды барвинка
Противоязвенные препараты	Циметидин Ранитидин Омепразол
Сердечно-сосудистые препараты	Ингибиторы АПФ (например, каптоприл, эналаприл) Амиодарон Блокаторы кальциевых каналов (например, нифедипин, дилтиазем) Метилдопа Резерпин Спиринолактон
Препараты, действующие на ЦНС	Диазепам Галоперидол Фенотиазины Трициклические антидепрессанты
Гормоны	Андрогены Анаболические стероиды Эстрогены Гормон роста
Безрецептурные растительные препараты	Лавандовое масло Масло чайного дерева
Другие препараты	Ауранофин (в РФ не зарегистрирован) Амфепрамон Домперидон Метоклопрамид Фенитоин Пеницилламин Сулиндак (в РФ не зарегистрирован) Теофиллин

Таблица 1. [Справочник MSD. Профессиональная версия.](#)

* Не для всех препаратов, прием которых ассоциирован с гинекомастией, показана способность вызывать гинекомастию при провокационных пробах.

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент; ЦНС – центральная нервная система; ГнВГ – гонадотропин-рилизинг-гормон.