

IgM полож. IgG отриц.	Может свидетельствовать о подострой фазе инфекции COVID-19, не предоставляя информации о том, есть или нет у пациента клинические проявления инфекции, является ли он потенциальным распространителем вируса или нет. Рекомендовано: • дообследование тестом для определения вируса РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР • соблюдение режима самоизоляции в течение 2х недель Наличие специфических IgM к SARS-CoV-2, в отсутствие IgG, признаков заболевания и при отрицательных результатах исследования вирусной РНК (ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей может свидетельствовать о поздней подострой фазе инфекции COVID-19. • Рекомендуется повтор анализа на антитела класса G через 2-4 недели Наличие специфических IgM к SARS-CoV-2, в отсутствие IgG, признаков заболевания при положительных результатах исследования вирусной РНК (ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей может свидетельствовать о подострой фазе инфекции COVID-19 с выделением вируса и возможностью стать источником потенциального заражения. • Рекомендуется соблюдение режима самоизоляции в течение 2х недель и консультация врача.
IgM отриц. IgG полож.	Положительный тест на IgG свидетельствует о факте контакта в прошлом с вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа. Предполагается, что вероятность повторного заражения в данном случае существенно ниже, чем у пациентов с отрицательным результатом. Однако возможность подтверждения наличия устойчивого иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 данным тестом в настоящее время не подтверждена. Возможность выделения вируса с потенциальной возможностью заражения окружающих минимальная. Дополнительного обследования при отсутствии особых текущих показаний (в т.ч. наличие клинической симптоматики, факторов высокого эпидемиологического риска) или же при факте перенесенной в прошлом COVID-19 - обычно не требуется. Мы рекомендуем продолжать соблюдение мер социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты, так как на сегодняшний день не накоплено достаточно данных, позволяющих полностью исключить возможность повторного заражения.
IgM полож. IgG полож.	Данное сочетание может свидетельствовать о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа. Вероятность повторного заражения в данном случае в существенно ниже, чем у пациентов с отрицательным результатом. Возможность выделения вируса с потенциальной возможностью заражения окружающих минимальная. Дополнительного обследования при отсутствии особых текущих показаний (в т.ч. наличие клинической симптоматики, факторов высокого эпидемиологического риска) или же при факте перенесенной в прошлом COVID-19 - обычно не требуется. Мы рекомендуем продолжать соблюдение мер социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты, так как на сегодняшний день не накоплено достаточно данных, позволяющих полностью исключить возможность повторного заражения.
Ig M отриц. IgG отриц.	Нет данных указывающих на контакт организма с вирусом SARS-CoV-2 с выработкой специфического антительного иммунного ответа. • Рекомендуется повтор анализов на антитела M и G через 2-4 недели. В качественных тестах результат представлен в виде индекса («коэффициент позитивности» - КП, иногда называют «индекс позитивности»), отражающего отношение результата в пробе пациента к порогу. Его получают делением результата измерения в пробе пациента к порогу. То есть - если результат пациента = пороговому значению, КП = 1, выше 1 – положительный, ниже 1 – отрицательный. Иногда, в зависимости от производителя, выделяют сомнительную околопороговую зону, например, индекс 0,8 – 1, 0 = сомнительно. Чем выше КП – тем ориентировочно больше антител. Но качественные тесты не позволяют сделать вывод, что при КП=10 уровень антител обязательно в 2 раза больше, чем при КП= 5.