INVITRO

Инструкция по сбору мочи на микробиологические исследования

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима порция мочи. Контейнер необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО. Контейнер для сбора мочи можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Исследование проводят до начала приема противомикробных препаратов и иммуномодуляторов или спустя 12-14 дней после окончания приема лекарственных средств. Лучше всего использовать первую утреннюю мочу. Допускается сбор случайной мочи при условии, что она получена не ранее, чем через 2-3 часа после предыдущего мочеиспускания.
Информация «куда собирать».	Собрать пробу мочи в стерильный контейнер с завинчивающейся крышкой.
Информация «как собирать».	1. Вымыть руки с мылом. 2. Подготовить контейнер, приоткрыв крышку контейнера так, чтобы ее можно было снять одной рукой. Не дотрагиваться руками до внутренних стенок контейнера и крышки. 3. Направить струю мочи в контейнер и наполнить его до половины объема, приблизительно 40-50 мл, не касаясь краев контейнера. 4. Плотно закрыть контейнер крышкой.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	**Для исследования непригодна** проба, собранная в нестерильный или неплотно закрытый контейнер.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	**Условия хранения** До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2…+8° С. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. **Условия транспортировки** Желательно доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2…+8°С (например, в термосе с кубиком льда или в пакете с хладоэлементами).