INVITRO

Инструкция по сбору грудного молока на микробиологические исследования

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима проба грудного молока. Контейнер необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО. Контейнер для сбора молока можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Исследование проводят до начала приема противомикробных препаратов и иммуномодуляторов или спустя 12-14 дней после окончания приема лекарственных средств. Молоко из правой и левой молочной железы исследуется отдельно. Начальная порция (5-10 мл) для анализа не используется, она сцеживается в отдельную посуду и выливается.
Информация «куда собирать».	Собрать пробу грудного молока в стерильный контейнер с красной крышкой.
Информация «как собирать».	1. Перед сцеживанием молока тщательно вымыть руки и молочные железы с мылом, обработать соски и околососковую область ватными тампонами, смоченными 70% спиртом (каждая железа обрабатывается отдельным тампоном). 2. Сцедить первые 5-10 мл в отдельную посуду (эта порция молока не пригодна для исследования), последующие 4-5 мл сцедить в стерильный контейнер с красной крышкой, не касаясь краев контейнера телом. 3. Молоко из каждой железы собрать в отдельный контейнер. После сцеживания плотно закрыть крышку, не дотрагиваясь до краев контейнера руками. 4. Подписать каждый контейнер, указав Ф.И.О., дату рождения. На каждом контейнере необходимо отметить: «правая молочная железа» или «левая молочная железа».
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	**Для исследования непригодны:** • проба, собранная в нестерильный или неплотно закрытый контейнер; • проба, собранная в несколько приемов в один контейнер в течение более 24 часов; • проба, собранный накануне.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	**Условия хранения** До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2…+8°С. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день взятия (не позднее 4-6 часов с момента сбора). **Условия транспортировки** Желательно доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2…+8°С (например, в термосе с кубиком льда или в пакете с хладоэлементами).