

Гастроскопия и колоноскопия

Подготовка

Перед проведением исследования необходимо соблюдать обязательную подготовку.
Перед проведением исследования сообщите врачу о приеме антикоагулянтов.*
Прием таких препаратов необходимо отменить за 5 суток до исследования.

В течение 3-х дней требуется соблюдение особой диеты:

⊗ Исключить из употребления

- черный хлеб
- свежие овощи и фрукты
- зелень
- грибы
- бобовые
- ягоды
- злаковые
- семечки и орехи
- варенье с косточками
- виноград
- киви

☑ Рекомендуется употреблять в пищу:

- бульон
- манная каша
- яйцо
- отварное мясо
- курятина
- вареная колбаса
- рыба
- сыр
- масло
- белый хлеб
- кисломолочные продукты, кроме творога

Накануне исследования можно употреблять в пищу только бульоны, кисели, соки без мякоти.

Подготовка препаратом Фортранс.

Одноэтапная подготовка (если исследование проводится до 14-00)

Накануне исследования: последний прием пищи (из списка разрешенных продуктов) не позднее 15-00. С 16-00 до 20-00 необходимо принять (выпить) препарат Фортранс.

Расчетный норматив объема препарата: 1 пакетик на 1 литр воды/20 кг веса пациента. При весе менее 60 кг – минимальный объем 3 литра готового раствора.

Принимать (пить) по 1 стакану готового раствора каждые 15 минут.

В день исследования: Не есть и не пить!

Двухэтапная подготовка (если исследование проводится после 14-00)

Накануне исследования: последний прием пищи (из списка разрешенных продуктов) не позднее 15-00. С 18-00 до 20-00 необходимо принять (выпить) препарат Фортранс.

Содержимое 2-х пакетиков препарата растворить в 2-х литрах воды комнатной температуры. Принимать (пить) по 1 стакану готового раствора каждые 15 минут.

В день исследования: Не есть! Прием препарата Фортранс повторить, завершив подготовку за 8 часов до исследования (т.е. с 08-00 до 10-00).

Содержимое 2-х пакетиков препарата растворить в 2-х литрах воды комнатной температуры. Принимать (пить) по 1 стакану готового раствора каждые 15 минут.

За 4 часа до исследования не пить!

Подготовка препаратом Мовипреп.

Одноэтапная вечерняя подготовка (если исследование проводится до 14-00)

Накануне исследования:

Завтрак (не позднее 09-00): согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей

Обед и ужин: Только разрешенные прозрачные жидкости.

Приготовление раствора: Содержимое саше А и саше Б необходимо растворить в небольшом количестве воды комнатной температуры и довести объем жидкости до 1 литра. Второй литр готовится аналогичным способом.

Прием препарата:

18:00 – 19:00 Необходимо принять первый литр раствора препарата.

20:00 – 21:00 Необходимо принять второй литр раствора препарата.

В день исследования: Не есть и не пить!

Одноэтапная утренняя подготовка (если исследование проводится после 14-00)

В день исследования: Не есть!

Приготовление раствора: Содержимое саше А и саше Б необходимо растворить в небольшом количестве воды комнатной температуры и довести объем жидкости до 1 литра. Второй литр готовится аналогичным способом.

Прием препарата:

07:00 – 08:00 Необходимо принять первый литр раствора препарата.

08:00 – 08:30 Необходимо выпить 500 мл разрешенной жидкости.

08:30 – 09:30 Необходимо принять второй литр раствора препарата.

09:30 – 10:00 Необходимо выпить 500 мл разрешенной жидкости

После 10-00 Не пить!