INVITRO

Инструкция по самостоятельному взятию соскоба с помощью устройства «Квинтип»® (Qvintip®)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима проба вагинального отделяемого. В медицинском офисе следует заранее приобрести устройство «Квинтип»® (Qvintip®) для самостоятельного сбора пробы.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	**Общие требования** Не рекомендуется взятие пробы во время менструации. **Специальные требования** Самостоятельное взятие целесообразно проводить в первую половину менструального цикла, не ранее 5-го дня. Допустимо обследование во второй половине цикла, не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого начала менструации. 1. Устройство «Квинтип»® для самостоятельного взятия соскоба предназначено только для одноразового использования. 2. Перед использованием необходимо проверить целостность и комплектность набора: он должен содержать пластиковый аппликатор (состоит из синей и белой частей), пробирку с крышкой и инструкцию. 3. Белую часть палочки нельзя сгибать или отламывать до процедуры взятия пробы. 4. Не менее чем за 48 часов перед самостоятельным взятием влагалищного отделяемого: а) следует избегать применения влагалищных суппозиториев, кремов, спринцеваний, препаратов местного действия; б) воздерживаться от половых контактов, а также от интравагинального ультразвукового исследования, кольпоскопии и гинекологических осмотров.
Информация «куда собирать».	Пластиковый аппликатор с вагинальным отделяемым переносится в пробирку.
Информация «как собирать».	 1. Вымойте руки с мылом, сполосните и вытрите насухо. 2. Примите удобную для вас позу, позволяющую легко ввести пластиковый аппликатор во влагалище. 3. Достаньте пластиковый аппликатор из упаковки, держа его за синюю ручку. Держите пластиковый аппликатор во время взятия пробы прямо. 4. Введите пластиковый аппликатор во влагалище до упора (примерно на 10 см). **ВНИМАНИЕ**! Не вводите пластиковый аппликатор, если чувствуете сопротивление. Пластиковый аппликатор должен вводиться без затруднений.  5. Осторожно поверните пластиковый аппликатор пять раз вокруг своей оси. 6. Не касаясь наружных половых органов, извлеките пластиковый аппликатор, удерживая его прямо. 7. Дайте пластиковому аппликатору высохнуть не менее 1 минуты, положив его на пробирку так, чтобы белая часть оставалась в воздухе, ни с чем не соприкасаясь. 8. Опустите белую часть пластикового аппликатора в пробирку. 9. Согните пластиковый аппликатор так, чтобы белая его часть отломилась и осталась в пробирке. 10. Закройте пробирку крышкой и утилизируйте синюю часть пластикового аппликатора. **ВНИМАНИЕ!** В случае неожиданных событий или реакций, не описанных в настоящем документе, произошедших в ходе самостоятельного взятия пробы, немедленно свяжитесь с врачом.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Не использовать устройство «Квинтип»® в целях, отличных от назначения изделия. **Недопустимые условия взятия** Отделяемое влагалища не следует брать во время беременности или в первые три месяца после родов, а также после недавно перенесенной гинекологической операции, в случае патологического кровотечения или боли в области таза. **Недопустимые условия хранения** Все компоненты изделия пригодны для использования в течение указанного срока хранения при соблюдении следующих условий: - Хранить в сухом месте при температуре от + 4°С до +30°С и относительной влажности не более 70% в запечатанном пакете. - Нельзя замораживать упаковку с изделием. - Избегать прямых солнечных лучей. - Избегать нагревания изделия.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	**Условия хранения** Хранить пробу в холодильнике при +2...+8°С или при комнатной температуре +22…+24°С не более 10 дней. **Условия транспортировки** Доставить в медицинский офис при температуре +2...+8°С или +22…+24°С в течение 10 дней.

Действует с 26.05.2023