СПИСКИ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ,

используемые при определении чувствительности патогенных и условно-патогенных энтеробактерий при исследовании кала (тесты 457, 437 форматов А и/или Φ , тест 461, тест 460; в тестах 456 и 456 Φ - только при выделении патогенных энтеробактерий)

| Патогенные энтеробактерии, Shigella spp. |
|--|
| Цефотаксим |
| Хлорамфеникол |
| Ампициллин |
| Ко-тримоксазол |
| Ципрофлоксацин |
| Цефтриаксон |
| Норфлоксацин |
| Офлоксацин |
| Патогенные энтеробактерии, Salmonella spp. |
| Цефотаксим |
| Хлорамфеникол |
| Ампициллин |
| Ко-тримоксазол |
| Цефтриаксон |
| Норфлоксацин |
| Офлоксацин |
| Условно-патогенные энтеробактерии для взрослых |
| Ампициллин |
| Цефотаксим |
| Ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол) |
| Нитрофурантоин |
| Ципрофлоксацин |
| Условно-патогенные энтеробактерии для детей |
| Ампициллин |
| Нитрофурантоин |
| Цефотаксим |
| Ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол) |
| Кампилобактер (Campylobacter) |
| Азитромицин |
| Ципрофлоксацин |
| Эритромицин |
| Тетрациклин |
| Кларитромицин |
| Доксициклин |

| Іатогенные энтеробактерии, Yersinia spp. |
|--|
| мпициллин |
| Со-тримоксазол |
| Ј ефтазидим |
| Ј ефепим |
| Т мипенем |
| Л еропенем |
| ентамицин |
| микацин |
| Ц ипрофлоксацин |
| Іевофлоксацин |
| Сетрациклин |