

Инструкция по сбору мочи на исследование «Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД)» (тест №147)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима разовая утренняя порция мочи. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Мочу собрать до 10 часов утра. Накануне сбора мочи необходимо придерживаться стандартной диеты и уровня потребления жидкости, избегать чрезмерных физических нагрузок. Исключить применение диуретиков. Желательно проводить исследование вне приема лекарственных препаратов (по согласованию с лечащим врачом!).
Информация «куда собирать».	Собрать порцию мочи в стерильный контейнер с крышкой.
Информация «как собирать».	1. Провести гигиеническую обработку наружных половых органов. 2. Желательно собрать среднюю порцию мочи. 3. Контейнер для сбора мочи следует заполнить на 1/3-1/2 объема (для исследования достаточно 4-5 мл мочи).
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки в МО материал может быть сохранен при температуре +2...+8°C не более 24 часов.

Действует с 29.01.2018