

Подготовка к исследованиям

445 Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears)

518 Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау)

116 Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка)

Взятие биоматериала (гинекологические мазки) не проводится:

- в период менструального кровотечения;
- после УЗИ с применением вагинального датчика (ранее чем через 48 часов);
- после кольпоскопии (ранее чем через 48 часов);
- после полового контакта (ранее чем через 48 часов);
- не рекомендовано взятие пробы в течение 2-х недель после установки внутриматочной спирали (ВМС).
- в период использования спермицидов, лубрикантов (ранее чем через 48 часов);
- в период использования интравагинальных лекарственных средств* (ранее чем через 4-7 дней после окончания применения);
- в случае применения интравагинальных антибактериальных/антисептических препаратов взятие биоматериала не ранее, чем через 14 дней после окончания применения; в случае приёма пероральных антибиотиков (внутрь/через рот) не ранее чем через 1 месяц;

Необходимо:

- исключить влагалищное спринцевание накануне и в день взятия биоматериала.
- до взятия биоматериала воздержаться от мочеиспускания в течение 3 часов.

Накануне сдачи анализа не рекомендуется употреблять овощи и фрукты, которые могут изменять цвет мочи (свеклу, морковь), принимать диуретики, витаминные комплексы.

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации.

Для исследования предпочтительно использовать среднюю порцию утренней мочи, которая в течение ночи собирается в мочевом пузыре (если лечащим врачом не рекомендовано иное).

С инструкцией по сбору биоматериала можно ознакомиться на сайте www.invitro.ru

Подготовка к исследованиям

N1864 Ультразвуковое исследование молочных желез в рамках чекапа/программы

- При регулярном менструальном цикле исследование рекомендуется проходить с 5 по 10-й день менструального цикла.

N1865 Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) в рамках чекапа/программы

- Исследование проводится с 5 по 8 день менструального цикла.
- За 2-3 дня до исследования исключить из рациона продукты, повышающие газообразование (выпечка, чёрный хлеб, цельное молоко, свежие фрукты и овощи).
- Исследование начинается с трансабдоминального доступа при умеренно наполненном мочевом пузыре (за час до исследования следует выпить 200-300 мл воды без газа), далее продолжается трансвагинально после опорожнения мочевого пузыря.

Возникли проблемы?

При возникновении проблем обратитесь
по телефону 8 (800) 200-363-0

