

Таблица 1.

Исходные характеристики (когорта исследования).	
Характеристики	Пациенты, n = 118 (%)
Возраст (лет)	
Медиана	70
1-й квартиль	63
3-й квартиль	75
Предшествующая терапия	
Химиотерапия	90 (76)
Кетоконазол	3 (3)
Ингибиторы АР	118 (100)
Тип новых ингибиторов оси АР	
Абиратерон	31 (26)
ТАК-700	18 (15)
Энзулатамид	69 (59)
Продолжительность терапии ингибиторами сигнальных путей АР	
Медиана (дни)	250
1-й квартиль	92
3-й квартиль	473
Локализация метастазов	
Кости	106 (90)
Лимфатический узел	56 (47)
Висцеральные метастазы	17 (14)
Нб (г/дл)	
≤ НУ	42 (36)
> НУ	76 (64)
ЩФ (МЕ/л)	
≤ НУ	38 (32)
> НУ	80 (68)
ЛДГ (МЕ/л)	
≤ НУ	33 (28)
> НУ	83 (70)
д/о	2 (2)
Альбумин (г/л)	
≤ НУ	104 (88)
> НУ	13 (11)
д/о	1 (1)
ФС по критериям ECOG	
0	57 (48)
1	52 (44)
2	9 (8)
Боль	
Нет	56 (47)
Да	62 (53)
ПСА (нг/мл)	
Медиана	71
1-й квартиль	28
3-й квартиль	240

ЩФ — щелочная фосфатаза; АР — андрогеновый рецептор; ECOG — Восточная объединенная онкологическая группа; Нб — гемоглобин; МЕ — международная единица; НУ — нормальный уровень; ЛДГ — лактатдегидрогеназа; ПСА — простатический специфический антиген; д/о — данные отсутствуют.