

Таблица 4.

Многофакторный анализ (когорта исследования)

Переменная	Многофакторный анализ рВБП			Многофакторный анализ ОВ		
	ОР	95 % ДИ	p-значение	ОР	95 % ДИ	p-значение
Раннее снижение уровня ПСА						
≥ 50 % в сравнении с < 50 %	0,33	0,2–0,5	7×10^{-6}	0,5	0,3–0,8	0,009
Боль						
Отсутствие или наличие	1,4	0,9–2,3	0,13	1,4	0,9–2,3	0,14
ЕКОГ						
0 в сравнении с 1–2	0,8	0,5–1,3	0,3	1,4	0,8–2,2	0,2
ЛДГ						
НУ в сравнении со значениями выше ВГН	1,56	0,9–2,5	0,08	1,6	0,9–2,8	0,08
ЩФ						
НУ в сравнении со значениями выше ВГН	0,9	0,5–1,5	0,6	1,16	0,7–1,9	0,6
Гемоглобин						
НУ в сравнении со значениями ниже НГН	0,9	0,56–1,1	0,6	1,45	0,8–2,7	0,2
Альбумин						
НУ в сравнении со значениями ниже НГН	3,8	1,9–7,8	0,0001	2,7	1,3–5,6	0,008
Висцеральные метастазы						
Отсутствие или наличие	1,5	0,8–2,7	0,16	2,1	1,1–3,9	0,02
ПСА						
Значения ниже медианы в сравнении со значениями не ниже медианы	0,7	0,5–1,1	0,16	0,96	0,6–1,6	0,9

ЩФ — щелочная фосфатаза; ДИ — доверительный интервал; ЕКОГ — Восточная объединенная онкологическая группа; ЕРР — раннее снижение уровня простатического специфического антигена (по оценке на 28-й день); Нб — гемоглобин; ОР — отношение рисков; ЛДГ — лактатдегидрогеназа, НУ — нормальный уровень; ОВ — общая выживаемость; рВБП — выживаемость без прогрессирования по данным рентгенографического исследования; ВГН — верхняя граница нормы; НГН — нижняя границы нормы