

Таблица 5.**Клинические исходы и однофакторный анализ (когорта применения абиратерона)**

| Клинический исход | Результаты |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| рВБП | |
| Медиана (месяцы, 95 % ДИ) | 5,4 (4,6–6,9) |
| ОВ | |
| Медиана (месяцы, 95 % ДИ) | 18,2 (16–26,5) |
| рВБП | |
| Раннее снижение уровня ПСА менее чем на 50 % (95 % ДИ) | 4,6 (3,9–6,2) |
| Раннее снижение уровня ПСА не менее чем на 50 % (95 % ДИ) | 7,9 (5,8–12) |
| (95 % ДИ) | 0,5 (0,3–0,8) |
| <i>p</i> -значение | 0,004 |
| ОВ | |
| Раннее снижение уровня ПСА менее чем на 50 % | 16,1 (11–20) |
| Раннее снижение уровня не менее чем на 50 % | н/д (от 23 до н/д) |
| (95 % ДИ) | 0,35 (0,2–0,7) |
| <i>p</i> -значение | 0,002 |

ДИ — доверительный интервал; EPR — раннее снижение уровня простатического специфического антигена; ОР — отношение рисков; рВБП — выживаемость без прогрессирования по данным рентгенографического исследования; ОВ — общая выживаемость; н/д — не достигнуто.