

Подготовка к исследованиям

445 Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears)

3033 ИНБИОФЛОР-СКРИН. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта

68 Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo)

73 HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский» антиген)

79 Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита С)

69 RPR тест (антикардиолипиновый тест) (Rapid Plasma Reagin Test)

70 Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно (антитела IgG, IgM к антигенам Treponema pallidum) (AntiTreponema pallidum IgG, IgM, Syphilis TP EIA, Total)

Взятие биоматериала (гинекологические мазки) не проводится:

- в период менструального кровотечения;
- после УЗИ с применением вагинального датчика (ранее чем через 48 часов);
- после кольпоскопии (ранее чем через 48 часов);
- после полового контакта (ранее чем через 48 часов);
- не рекомендовано взятие пробы в течение 2-х недель после установки внутриматочной спирали (ВМС).
- в период использования спермицидов, лубрикантов (ранее чем через 48 часов);
- в период использования интравагинальных лекарственных средств* (ранее чем через 4-7 дней после окончания применения);
- в случае применения интравагинальных антибактериальных/антисептических препаратов взятие биоматериала не ранее, чем через 14 дней после окончания применения; в случае приёма пероральных антибиотиков (внутрь/через рот) не ранее чем через 1 месяц;

Необходимо:

- исключить влагалищное спринцевание накануне и в день взятия биоматериала.
- до взятия биоматериала воздержаться от мочеиспускания в течение 3 часов.

Специальной подготовки не требуется.

Рекомендуется взятие крови не ранее, чем через 4 часа после последнего приема пищи.

Возникли проблемы?

При возникновении проблем обратитесь
по телефону 8 (800) 200-363-0

