

Таблица 4. Множественный (а) и логистический (б) регрессионный анализ влияния лечения на уровень гемоглобина г/дл и назначенный целевой показатель гемоглобина в 10–12 г/дл

	Все	Португалия	Польша
(а) Множественный регрессионный анализ влияния соответствующей переменной величины на уровень гемоглобина по группе исследования в целом и по группам из Португалии и Польши пот отдельности			
	Величина бета (p)	Величина бета (p)	Величина бета (p)
Возраст	0,002 (NS)	0,002 (NS)	0,006 (NS)
Пол	–0,166 (0,024)	–0,196 (0,035)	–0,068 (NS)
ИМТ	0,006 (NS)	–0,007 (NS)	0,009 (0,029)
ПФР	0,008 (0,002)	0,011 (0,005)	0,006 (NS)
Ферритин	–0,0004 (< 0,001)	–0,001 (< 0,001)	0,0002 (< 0,001)
Альбумин	0,005 (0,018)	0,070 (< 0,001)	0,004 (< 0,001)
ГПЩЖ	0,0003 (< 0,001)	0,0002 (0,026)	0,0003 (< 0,001)
(б) Логистический регрессионный анализ уровня гемоглобина 10–12 г/дл как показатель эффекта			
	Соотношение неравенства (p)	Соотношение неравенства (p)	Соотношение неравенства (p)
Возраст (лет)	1,005 (N.S.)	0,991 (N.S.)	1,027 (< 0,001)
Пол (М/Ж)	1,267 (N.S.)	1,337 (N.S.)	1,098 (N.S.)
ИМТ (кг/м ²)	0,995 (N.S.)	0,987 (N.S.)	0,988 (N.S.)
Альбумин(> 35 г/дл)	1,444 (N.S.)	1,314 (0,042)	1,498 (N.S.)
ПФР (20%–50%)	1,438 (0,008)	1,314 (N.S.)	1,498 (N.S.)
Ферритин (200–800 мкг/л)	1,521 (0,001)	1,865 (< 0,001)	1,341 (N.S.)
ГПЩЖ (150–600 пг/мл)	0,921 (N.S.)	0,967 (N.S.)	0,806 (N.S.)