

Таблица 2. Особенности пациентов

	Все	Португалия	Польша	p*
	(%)	(%)	(%)	
Гемоглобин 10–12 г/дл	67,3	65,8	69,5	N.S.
Гемоглобин > 12 г/дл	15,2	15,3	15,1	N.S.
Ферритин ≥200 мкг/л	84,4	82,9	86,6	N.S.
Ферритин ≥800 мкг/л	24,0	15,8	35,6	< 0,001
НТФ (NSAT) ≥20%	81,5	76,3	88,8	< 0,001
НТФ (TSAT) ≥50%	9,4	5,7	14,6	< 0,001
Лечение ПСЭ	76	78	74	0,056
Тип ПСЭ				N.S.
Дарбэпоэтин	24	22	26	
Епоэтин-бета	76	78	74	
Способ применения ПСЭ				< 0,001
Внутривенно	64,5	99,8	11,5	
Подкожно	35,5	0,2	88,5	
Частота приема ПСЭ				< 0,001
No ESA	23,6	21,7	26,3	
Раз в две недели	0,4	0,7	0	
Раз в неделю	15,0	2,1	33,2	
Два раза в неделю	15,9	11,1	22,6	
Три раза в неделю	45,1	64,5	18,0	
Модальность гемодиализа				< 0,001
ГДФ	46,6	91,4	0	
ГД	53,4	8,6	100	
spKt/V > 1,2	97,3	98,5	95,6	0,003

	Все	Португалия	Польша	<i>p</i> *
	(%)	(%)	(%)	
ОРМ $\geq 70\%$	90,8	95,4	84,4	< 0,001
Длительность курса ≥ 12 ч/нед.	93,8	94,0	93,6	N.S.
Назначенная скорость тока крови ≥ 300 мл/мин	94,1	97,4	89,4	< 0,001
Объем очищенной крови ≥ 1 л/кг массы тела	90,0	95,7	81,9	< 0,001
ЦВК (%)	16,5	14,5	19,3	0,026
АВ фистула (%)	76,8	77,1	76,4	N.S.
S-альбумин ≥ 35 г/л	89,7	95,4	81,8	< 0,001
Индекс коморбидности Чарлсона				< 0,001
менее 7	44,5	39,1	52,1	
7–12	51,9	56,7	45,2	
более 12	3,6	4,3	2,7	
Сахарный диабет	26	30	25	N.S.
Фосфор $\leq 5,5$ мг/дл	82,0	87,5	74,2	< 0,001
Кальций $\leq 10,2$ мг/дл	98,1	98,0	98,2	N.S.
ГПЩЖ 150–600 пг/мл	53,9	52,1	56,4	N.S.

* Критерий Хи-квадрат по странам