

Подготовка к исследованиям

445 Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears)

3033 ИНБИОФЛОР-СКРИН. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта

Взятие биоматериала (гинекологические мазки) не проводится:

- в период менструального кровотечения;
- после УЗИ с применением вагинального датчика (ранее чем через 48 часов);
- после кольпоскопии (ранее чем через 48 часов);
- после полового контакта (ранее чем через 48 часов);
- не рекомендовано взятие пробы в течение 2-х недель после установки внутриматочной спирали (ВМС).
- в период использования спермицидов, лубрикантов (ранее чем через 48 часов);
- в период использования интравагинальных лекарственных средств* (ранее чем через 4-7 дней после окончания применения);
- в случае применения интравагинальных антибактериальных/антисептических препаратов взятие биоматериала не ранее, чем через 14 дней после окончания применения; в случае приёма пероральных антибиотиков (внутрь/через рот) не ранее чем через 1 месяц;

Необходимо:

- исключить влагалищное спринцевание накануне и в день взятия биоматериала.
- до взятия биоматериала воздержаться от мочеиспускания в течение 3 часов.

Взятие биоматериала из урогенитального тракта осуществляет только врач-акушер-гинеколог по услуге **N1374**.
Записаться к врачу можно на сайте www.invitro.ru, у администратора или по телефону **8 (800) 200-363-0**.
Взятие биоматериала не входит в стоимость чекапа и оплачивается отдельно.

Подготовка к исследованиям

N1864 Ультразвуковое исследование молочных желез в рамках чекапа/программы

- При регулярном менструальном цикле исследование рекомендуется проходить с 5 по 10-й день менструального цикла.

N1865 Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) в рамках чекапа/программы

- Исследование проводится с 5 по 8 день менструального цикла.
- За 2-3 дня до исследования исключить из рациона продукты, повышающие газообразование (выпечка, чёрный хлеб, цельное молоко, свежие фрукты и овощи).
- Исследование начинается с трансабдоминального доступа при умеренно наполненном мочевом пузыре (за час до исследования следует выпить 200-300 мл воды без газа), далее продолжается трансвагинально после опорожнения мочевого пузыря.

Возникли проблемы?

При возникновении проблем обратитесь
по телефону 8 (800) 200-363-0

