

Таблица 1. Демографические и клинические характеристики пациентов с острым ишемическим инсультом и дислипидемией

	Терапия ртАП	Без терапии ртАП	Значение <i>p</i>
Количество пациентов	325	444	
Возрастная группа: кол-во (%)			
менее 50 лет	28 (8,6)	25 (5,6)	0,004*
от 50 до 59 лет	62 (19,1)	52 (11,7)	
от 60 до 69 лет	80 (24,6)	99 (22,3)	
от 70 до 79 лет	75 (23,1)	129 (29,1)	
старше 80 лет	80 (24,6)	139 (31,3)	
Среднее ± СО	68,25±13,4	71,90±12,8	0,333
Пол: количество (%)			
Мужской	182 (56,0)	203 (45,7)	0,006*
Женский	143 (44,0)	241 (54,3)	
Раса: количество (%)			
Европеоидная	266 (81,8)	361 (81,3)	0,920
Афроамериканская	55 (16,9)	76 (17,1)	
Другое	4 (1,2)	7 (1,6)	
Медицинский анамнез: количество (%)			
Гипертензия	298 (91,7)	390 (87,8)	0,096
Ишемическая болезнь сердца	124 (38,2)	183 (41,2)	0,413
Фибрилляция / трепетание предсердий	56 (17,2)	124 (27,9)	0,001*
Инсульт	90 (27,7)	166 (37,4)	0,005*
Транзиторная ишемическая атака	46 (14,2)	57 (12,8)	0,594
Застойная сердечная недостаточность	33 (10,2)	69 (15,5)	0,031*
Стеноз сонных артерий	14 (4,3)	44 (9,9)	0,004*
Заболевание периферических сосудов	26 (8,0)	43 (9,7)	0,446
Курение	93 (28,6)	83 (18,7)	0,001*

	Терапия ртАП	Без терапии ртАП	Значение <i>p</i>
Диабет	112 (34,5)	181 (40,8)	0,084
Применение лекарственных препаратов: количество (%)			
Антиагреганты	215 (66,2)	297 (66,9)	0,877
Антигипертензивные препараты	285 (87,7)	366 (82,4)	0,054
Препараты для снижения уровня холестерина	252 (77,5)	336 (75,7)	0,606
Препараты для лечения диабета	91 (28,0)	140 (31,5)	0,302
Первоначальная группа по шкале инсульта НИЗ: количество (%)			
0–9	203 (62,5)	317 (71,4)	0,077
10–14	44 (13,5)	46 (10,4)	
15–20	41 (12,6)	43 (9,7)	
21–25	37 (11,4)	38 (8,6)	
Среднее ± СО	9,42±6,6	7,37±6,6	0,565
Риск летального исхода по шкале программы Get With The Guidelines для ишемического инсульта:			
Среднее ± СО	5,45±6,0	4,62±5,3	0,093
Индекс массы тела			
Среднее ± СО	29,10±6,7	28,68±7,2	0,264

Непрерывные переменные представлены в виде средних значений ± стандартные отклонения (СО). Сравнения между группами проведены по Т-критерию Стьюдента. Дискретные переменные представлены в виде чисел (частота, выраженная в процентах). Сравнения между группой, получавшей ртАП, и группой, не получавшей ртАП, проведены по критерию хи-квадрат Пирсона.