

Таблица 1. Исходные клинические характеристики общего числа пациентов и пациентов, разделенных на группы со значением НЛС ниже и выше медианного показателя

Переменные	Общее число (<i>n</i> = 350)	Низкий НЛС (<i>n</i> = 175)	Высокий НЛС (<i>n</i> = 175)	<i>p</i>
НЛС	1,87 (1,44–2,47)	0,51–1,86	1,87–5,92	
Возраст (лет)	68 (55–77)	67 (53–75)	70 (60–78)	0,02
Мужчины (%)	239 (68)	110 (63)	129 (74)	0,03
Курение (%)	177 (51)	78 (45)	99 (57)	0,02
Сахарный диабет (%)	128 (37)	56 (32)	72 (41)	0,08
Дислипидемия (%)	246 (70)	119 (68)	127 (73)	0,35
Систолическое артериальное давление (мм рт. ст.)	130 (118–141)	127 (117–138)	134 (120–145)	0,03
Индекс массы тела (кг/м ²)	22,6 (20,5–25,4)	22,7 (20,4–25,7)	22,3 (20,6–24,9)	0,72
Суточная протеинурия (г/сутки)	0,8 (0,2–2,1)	0,6 (0,2–1,8)	1,0 (0,3–2,2)	0,49
Гемоглобин (г/дл)	11,6 (10,0–13,0)	11,9 (10,4–13,3)	11,0 (9,5–12,7)	<0,01
СРБ (мг/дл)	0,09 (0,05–0,17)	0,07 (0,05–0,15)	0,10 (0,05–0,19)	0,02
рСКФ (мл/мин/1,73 м ²)	33,6 (22,6–56,8)	36,8 (26,6–70,3)	30,7 (20,9–43,4)	<0,01
Нейтрофилы (/мкл)	3094 (2449–3975)	2704 (2151–3212)	3643 (2909–4430)	<0,01
Лимфоциты (/мкл)	1703 (1279–2048)	1940 (1598–2347)	1499 (1111–1805)	<0,01
Сывороточный альбумин (г/дл)	3,5 (3,2–3,8)	3,6 (3,2–3,9)	3,5 (3,2–3,8)	0,31
Фосфаты (мг/дл)	3,5 (3,2–3,9)	3,5 (3,2–4,0)	3,5 (3,1–3,9)	0,62
ИБС в анамнезе (%)	57 (16)	21 (12)	36 (21)	0,03

Данные представлены в числовом (проценты) или медианном (межквартильный интервал) значении.

НЛС – соотношение нейтрофилы/лимфоциты; СРБ – С-реактивный белок; рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации; ИБС – ишемическая болезнь сердца.