

Таблица 1. Результаты обследования до и после операции

	До операции (n = 9)	После операции (n = 9)	P- значение
Возраст (лет)	62,0 (50,5–63,0)		
Муж (% , n)	55,56%, 5		
Вес (кг)	127,0 (116,5–144,8)	100,2 (83,6–110,9)	0,004
ИМТ (кг/м ²)	45,5 (42,2–47,8)	34,3 (29,3–38,3)	0,008
ППТ (м ²)	2,28 (2,18–2,45)	2,08 (1,97–2,14)	0,004
Креатинин (мкмоль/л)	122,5 (96,8–149,5)	110,0 (88,0–116,0)	0,01
Цистатин С (мг/л)	1,6 (1,3–2,1)	1,7 (1,4–1,8)	0,64
EDTA СКФ	58,0 (48,5–91,0)	59,0 (48,9–72,5)	0,38
EDTA СКФ с учетом ППТ (мл/мин/1,73 м ²)	43,6 (37,0–65,0)	45,8 (41,7–63,2)	0,30
MDRD СКФ (мл/мин/1,73м ²)	51,0 (38,3–60,3)	53,5 (42,3–65,3)	0,08
СКД Ері (мл/мин/1,73м ²)	54,0 (42,0–65,0)	61,0 (48,5–71,0)	0,008
СКД Ері цистатин (мл/мин/1,73м ²)	39,0 (27,0–49,0)	40,0 (34,5–49,8)	1,0
СКД Ері цистатин креатинин (мл/мин/1,73м ²)	43,0 (33,0–56,0)	47,5 (42,0–54,8)	0,34
Клиренс креатинина по Кокрофта–Голту (мл/мин/1,73 м ²)	77,2 (61,6–89,0)	75,0 (64,1–92,3)	0,93

Сокращения: ИМТ - индекс массы тела, ППТ - площадь поверхности тела, СКД Ері - Сотрудничество в области эпидемиологии хронических заболеваний почек, EDTA - этилендиаминтетрауксусная кислота, MDRD - модификация диеты при заболеваниях почек