

Таблица 2. Связь между НЛС и клиническими характеристиками

Переменные	Одновариантный		Мультивариантный	
	β	p	β	p
Возраст (лет)	0,14	0,01	−0,12	0,12
Мужчины	0,13	0,01	0,09	0,18
Сахарный диабет	0,05	0,31	−0,04	0,55
Систолическое артериальное давление (мм рт. ст.)	0,10	0,07	0,07	0,25
Курение	0,08	0,14	0,00	0,99
Дислипидемия	0,03	0,58	−0,01	0,85
Ишемическая болезнь сердца	0,18	<0,01	0,13	0,02
Индекс массы тела (кг/м ²)	−0,01	0,85	0,02	0,77
Суточная протеинурия (г/сут)	0,02	0,72	−0,11	0,22
Гемоглобин (г/дл)	−0,17	<,01	−0,08	0,31
рСКФ (мл/мин/1,73 м ²)	−0,26	<0,01	−0,23	<0,01
Сывороточный фосфор (мг/дл)	0,00	0,93	−0,01	0,83
Сывороточный а (г/дл)	−0,06	0,30	−0,08	0,35
СРБ (мг/дл)	0,15	<0,01	0,11	0,04

НЛС – соотношение нейтрофилы/лимфоциты; рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации; СРБ – С-реактивный белок.