

Таблица 3. Корреляции между параметрами образцов ткани, инкубированных без DL-гомоцистеина (DL-ГЦ) (контроль), и теми же параметрами образцов ткани тонких и толстых сегментов внутрипросветного тромба (ВПТ) и прилежающих стенок аневризмы брюшной аорты (АБА) после инкубации с DL-ГЦ в различной концентрации

		Сегменты стенок АБА, прилежащих к ВПТ				Внутрипросветный тромб			
		Участок А		Участок В		Участок А1		Участок В1	
Параметр	Корреляция	г	р	г	р	г	р	г	р
ММП-2	контроль по сравнению с 100 мкМ/л ГЦ	<u>0,69</u> <u>7</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,35</u> <u>8</u>	<u>0,030</u>	<u>0,84</u> <u>3</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,74</u> <u>2</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>
	контроль по сравнению с 500 мкМ/л ГЦ	<u>0,46</u> <u>8</u>	<u>0,003</u>	<u>0,49</u> <u>3</u>	<u>0,002</u>	<u>0,66</u> <u>2</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,74</u> <u>5</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>
ММП-9	контроль по сравнению с 100 мкМ/л ГЦ	<u>0,43</u> <u>2</u>	<u>0,008</u>	0,20 8	0,217	<u>0,56</u> <u>8</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	- 0,06 2	0,717
	контроль по сравнению с 500 мкМ/л ГЦ	<u>0,68</u> <u>9</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,58</u> <u>7</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	0,23 8	0,156	- 0,04 1	0,650
ТФ	контроль по сравнению с 100 мкМ/л ГЦ	<u>0,57</u> <u>4</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,59</u> <u>4</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,90</u> <u>4</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,74</u> <u>0</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>
	контроль по сравнению с 500 мкМ/л ГЦ	<u>0,63</u> <u>4</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,40</u> <u>2</u>	<u>0,014</u>	<u>0,74</u> <u>9</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,92</u> <u>6</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>
т-АП	контроль	<u>0,78</u>	<u>0,000</u>	<u>0,55</u>	<u>0,000</u>	<u>0,76</u>	<u>0,000</u>	<u>0,39</u>	<u>0,015</u>

	по сравнению с 100 мкМ/л ГЦ	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	
	контроль по сравнению с 500 мкМ/л ГЦ	0,30 3	0,073	<u>0,51</u> <u>9</u>	<u>0,001</u>	<u>0,50</u> <u>1</u>	<u>0,002</u>	0,16 8	0,321
Плазминоген	контроль по сравнению с 100 мкМ/л ГЦ	0,11 4	0,503	<u>0,50</u> <u>8</u>	<u>0,001</u>	0,31 1	0,065	<u>0,81</u> <u>5</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>
	контроль по сравнению с 500 мкМ/л ГЦ	- 0,08 2	0,628	<u>0,73</u> <u>1</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,34</u> <u>7</u>	<u>0,036</u>	<u>0,56</u> <u>4</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>
ИАП-1	контроль по сравнению с 100 мкМ/л ГЦ	<u>0,52</u> <u>5</u>	<u>0,001</u>	<u>0,58</u> <u>2</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>	<u>0,37</u> <u>9</u>	<u>0,021</u>	<u>0,73</u> <u>4</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>
	контроль по сравнению с 500 мкМ/л ГЦ	<u>0,38</u> <u>9</u>	<u>0,017</u>	<u>0,44</u> <u>6</u>	<u>0,006</u>	<u>0,36</u> <u>9</u>	<u>0,025</u>	<u>0,77</u> <u>9</u>	<u>0,000</u> <u>1</u>

г, р, коэффициент корреляции Пирсона и значение р; ММП-2,9 - матриксная металлопротеиназа 2 или 9; ТФ - тканевой фактор; т-АП, тканевой активатор плазминогена; ИАП-1 - ингибитор активатора плазминогена 1. Участок А = стенка, прилегающая к толстому сегменту ВПТ; участок В = стенка, прилегающая к тонкому сегменту ВПТ; участок А1 = толстый сегмент ВПТ; участок В1 = тонкий сегмент ВПТ. Единицы измерения приведены на рисунке 1. Подчеркнутые значения отражают выраженные корреляции.