

Таблица 3. Относительные риски неблагоприятных почечных исходов при высоком числе нейтрофилов, низком числе лимфоцитов и высоком НЛС согласно модели пропорциональных рисков Кокса

	Частота встречаемости (100 человек/год)	Модель 1			Модель 2			Модель 3		
		ОР	95% ДИ	p	ОР	95% ДИ	p	ОР	95% ДИ	p
Группа с низким числом нейтрофилов	6,63	(контроль)			(контроль)			(контроль)		
Группа с высоким числом нейтрофилов	9,14	1,51	0,98–2,35	0,06	1,29	0,83–2,01	0,27	1,13	0,71–1,81	0,60
Группа с высоким числом лимфоцитов	5,73	(контроль)			(контроль)			(контроль)		
Группа с низким числом лимфоцитов	9,81	1,51	0,96–2,40	0,07	1,65	1,06–2,61	0,03	1,14	0,68–1,93	0,61
Группа с низким НЛС	4,96	(контроль)			(контроль)			(контроль)		
Группа с высоким НЛС	11,10	2,22	1,42–3,54	<0,01	2,06	1,31–3,30	<0,01	1,67	1,02–2,77	0,04

Модель 1: с корректировкой на возраст и пол.

Модель 2: модель 1 плюс корректировка на курение, сахарный диабет, систолическое артериальное давление и дислипидемию.

Модель 3: модель 2 с корректировкой на прием иммуносупрессоров и/или ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при выписке, индекс массы тела, суточную протеинурию, гемоглобин, С-реактивный белок, расчетную скорость клубочковой фильтрации, фосфаты и ишемическую болезнь сердца.

НЛС – соотношение нейтрофилы/лимфоциты; ОР – относительные риски; ДИ – доверительный интервал.