

Таблица 1. Исходные характеристики в группе клинических случаев КН и контрольной группе

	Пац. с КН (354 чел.)	Контр. (377 чел.)	P-критерий
Возраст (кол-во лет)	58,52 ± 11,10	37,3 ± 14,7	0,000
Пол (муж. / жен.)	235/119	246/131	0,9009
Гипертензия (n)	1,31 ± 0,51	1,78 ± 0,41	0,001
Глюкоза (ммоль/л)	1,39 ± 0,53	1,82 ± 0,38	0,000
Х-ЛПВП (ммоль/л)	1,37 ± 0,56	1,46 ± 0,63	0,103
Х-ЛПНП (ммоль/л)	1,65 ± 0,96	1,55 ± 0,80	0,191
Холест.-С (ммоль/л)	1,17 ± 0,46	1,10 ± 0,36	0,041
ТГ-С (ммоль/л)	1,51 ± 0,82	1,16 ± 0,46	0,000

Не выявлено статистически значимых различий по полу между двумя группами. Тем не менее, результаты показали заметный разброс в возрасте пациентов в каждой группе, даже с учетом того, что контрольная группа была в среднем несколько моложе пациентов с КН. Другие параметры, включая артериальное давление и уровень глюкозы, были выше в контрольной группе, чем у пациентов с КН. Не было выявлено существенных различий между двумя группами в таких показателях липидов, как уровни ЛПНП и ЛПВП. Тем не менее, уровни холестерина и триглицеридов были выше у пациентов с КН, чем в контрольной группе, хотя некоторые из них принимали аторвастатин.