

Таблица 1. Различия в показателях общего холестерина (ммоль/л) и систолического артериального давления (мм. рт. ст.) между кардиопрофилактическим скринингом и программой клинического обследования^a

	Программа кардиопрофилактического скрининга	Программа клинического обследования ^b			Intraclass correlation		Программа клинического обследования ^c	Внутриклассовая корреляция		ВКК	95%-CI
	Среднее значение (SE)	Среднее значение (SE)	Средняя разница (SE)	p-значение	ВКК	95%-CI	Среднее значение (SE)	Средняя разница ^c (SE)	p-значение		
Общий холестерин	5,75 (0,63)	5,54 (0,58)	0,21 (0,03)	<,001	,91	,87–,94					
Систолическое артериальное давление	140,48 (1,00)	133,97 (0,99)	6,51 (0,82)	<,001	,60	,27–,75	128,63 (0,87)	11.86 (0.83)	<.001	.91	.84–.95

SE – стандартная ошибка, ВКК – внутриклассовый коэффициент корреляции, CI – доверительный интервал.

^aРегуляция по полу, возрасту, условиям набора и продолжительности между кардиопрофилактическим скринингом и программой клинического обследования. Значение систолического артериального давления соответствует первому измерению^b, среднему значению второго и третьего измерений^c.