

Таблица 2. Результаты лабораторных анализов в исследуемой популяции

Показатель	Выживший (n = 370)	Невыживший (n = 110)	P-значение
Общий холестерин (мг/дл)	181 ± 43	163 ± 39	0,001
СК ^а _{пост.} (мг/дл)	0,86 (0,76–1,02)	0,95 (0,80–1,26)	0,048
Гемоглобин (г/дл)	14,0 ± 1,2	13,2 ± 2,2	<0,001
Л (10 ³ /мм ³)	12 ± 4	12 ± 5	0,781
Тромбоциты _{пост.} (10 ³ /мм ³)	273 ± 78	271 ± 93	0,846
Тромбоциты _{48 - 72 ч.} (10 ³ /мм ³)	241 ± 73	235 ± 90	0,448
MPV _{пост.} (фл)	9,0 ± 1,6	9,0 ± 1,3	0,648
MPV _{48 - 72 ч.} (фл)	9,4 ± 1,6	9,8 ± 1,4	0,035
ΔMPV ^а (фл)	0,37 (– 0,1–0,89)	0,79 (0,30–1,40)	<0,001
ФВЛЖ (%)	45 ± 9	41 ± 10	<0,001

Список сокращений: ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка, СК – сывороточный креатинин при поступлении, MPV – средний объем тромбоцитов, ΔMPV – изменение среднего объема тромбоцита, Л – лейкоциты.

^аСравнение было выполнено с помощью U-критерия Манна - Уитни при значении P < 0,05, и эти значения были описаны медианой с межквартильным диапазоном (25-й и 75-й перцентили).