

**Таблица 3. Средние значения наиболее актуальных эхокардиографических показателей у пациентов с СНиФВ и у пациентов с СНсФВ**

Эхокардиографические показатели	Исходное обследование	После 6 месяцев лечения	P-значение
<b>Пациенты с СНиФВ (<i>n</i> = 16)</b>			
ФВЛЖ (%)	34 ± 6	50 ± 14	<i>p</i> < 0,001
КДРЛЖ, мл	142 ± 29	122 ± 67	<i>p</i> < 0,01
КСРЛЖ, мл	81 ± 23	78 ± 20	нз
СДПЖ, мм рт. ст.	36 ± 9	33 ± 8	<i>P</i> < 0,001
<b>Пациенты с СНиФВ (<i>n</i> = 40)</b>			
ФВЛЖ (%)	58 ± 7	61 ± 7	нз
КДРЛЖ, мл	104 ± 31	92 ± 22	нз
КСРЛЖ, мл	41 ± 20	39 ± 8	нз
СДПЖ, мм рт. ст.	36 ± 11	32 ± 9	<i>P</i> < 0,001

*СНиФВ – сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса, ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка, КДРЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка, КСРЛЖ – конечный систолический размер левого желудочка, СДПЖ – систолическое давление в правом желудочке, СНсФВ – сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, нз – незначимы.*