

Таблица 3. Логистический регрессионный анализ уровней биомаркеров при поступлении и их связь с неблагоприятным краткосрочным исходом среди 267 пациентов, госпитализированных по поводу внебольничной пневмонии

Биомаркер	Однофакторный анализ		Многофакторный анализ [#]	
	ОР (95% ДИ)	р-значение	ОР (95% ДИ)	р-значение
ПКТ	1,40 (1,16–1,69)	0,001	1,29 (1,06–1,58)	0,012
РТХЗ	2,46 (1,49–4,06)	<0,001	1,88 (1,11–3,19)	0,018
Пресепсин	1,40 (1,12–1,74)	0,003	1,32 (1,04–1,67)	0,022
РСТ	1,40 (1,16–1,69)	0,001	1,29 (1,06–1,58)	0,012
РТХЗ	2,46 (1,49–4,06)	<0,001	1,88 (1,11–3,19)	0,018
Пресепсин	1,40 (1,12–1,74)	0,003	1,32 (1,04–1,67)	0,022

ПКТ: прокальцитонин; РТХЗ: пентраксин 3, [#]: корректировка на значение шкалы тяжести CURB-65 (спутанность сознания, мочевины >7 ммоль/л⁻¹, частота дыхательных движений ≥30 /мин⁻¹, артериальное давление <90 мм рт. ст. (систолическое) или ≤60 мм рт. ст. (диастолическое), возраст ≥65 лет).