

**Таблица 1. Стандартизированная по возрасту распространенность применения статинов для вторичной профилактики**

Группа	СВР применения статинов для вторичной профилактики в 1999 г.	Итог	Тенденция 1		Тенденция 2		Тенденция 3	
		СГПИ	Годы	ГПИ	Годы	ГПИ	Годы	ГПИ
Всего	8,4 %	12,5 [10,9; 14,1]*	1999– 2005	25,4 [21,8; 29,0]*	2005– 2013	3,7 [1,7; 5,6]*		
Женщины	6,5 %	12,6 [10,9; 14,3]*	1999– 2005	25,0 [21,3; 28,8]*	2005– 2013	4,1 [2,1; 6,2]*		
50–59	7,6 %	8,3 [5,7; 10,8]*	1999– 2005	21,0 [15,5; 26,9]*	2005– 2013	−0,4 [−3,4; 2,6]		
60–69	13,6 %	7,3 [5,1; 9,6]*	1999– 2006	15,2 [11,4; 19,2]*	2006– 2013	−0,1 [−3,4; 3,3]		
70–79	6,6 %	14,0 [12,1; 16,0]*	1999– 2004	31,0 [27,7; 34,4]*	2004– 2008	11,2 [5,0; 17,8]*	2008– 2013	1,3 [−1,3; 3,9]
80+	1,2%	23,2 [17,3; 29,4]*	1999– 2005	40,0 [26,8; 54,5]*	2005– 2013	11,9 [5,0; 19,3]*		
Мужчины	10,0 %	12,3 [10,7; 13,9]*	1999– 2005	25,4 [21,8; 29,0]*	2005– 2013	3,4 [1,5; 5,3]*		
50–59	18,3 %	6,5 [4,7; 8,4]*	1999– 2005	17,2 [13,2; 21,4]*	2005– 2013	−0,8 [−3,0; 1,5]		
60–69	12,7 %	10,7 [9,0; 12,4]*	1999– 2005	24,9 [21,2; 28,8]*	2005– 2013	1,0 [−0,9; 3,1]		
70–79	7,6 %	15,5 [13,7;	1999– 2005	29,2 [25,1;	2005– 2013	6,2 [4,1;		

Группа	СВР применения статинов для вторичной профилактики в 1999 г.	Итог	Тенденция 1		Тенденция 2		Тенденция 3	
		СГПИ	Годы	ГПИ	Годы	ГПИ	Годы	ГПИ
		17,4] <sup>*</sup>		33,3] <sup>*</sup>		8,4] <sup>*</sup>		
80+	0,8%	28,0 [22,8; 33,3] <sup>*</sup>	1999– 2005	59,1 [46,5; 72,9] <sup>*</sup>	2005– 2013	8,7 [3,0; 14,6] <sup>*</sup>		

\* $p < 0,05$ ; СВР – стандартизированная по возрасту распространенность, СГПИ – среднее годовое процентное изменение, ГПИ – годовое процентное изменение.