

Таблица 3. Стандартизированная по возрасту заболеваемость ССЗ / болезнями сердца при вторичной профилактике у принимающих статины и у тех, кто статины не принимает

Группа	СВЗ сердечно-сосудистыми заболеваниями / болезнями сердца в 1999 г.	Итог	Тенденция 1		Тенденция 2	
		СГПИ	Годы	ГПИ	Годы	ГПИ
Всего	51,7‰	-3,9 [- 7,4; - 0,4]*	1999– 2001	13,7 [- 34,4; 13,5]	2001– 2013	-2,2 [- 3,8; - 0,6]*
Принимающие статины	69,5‰	-3,4 [- 6,7; 0,1]	1999– 2001	34,5 [- 62,6; 14,7]	2001– 2013	-0,4 [- 3,7; 2,9]
50–59 ^a	28,3‰ ^a	2,6 [-4,3; 9,9]	2001– 2013	2,6 [- 4,3; 9,9]		
60–79	37,3‰	-0,5 [- 2,8; 1,9]	1999– 2013	-0,5 [- 2,8; 1,9]		
80 + ^b	55,9‰ ^b	-7,2 [- 29,0; 21,3]	2004– 2013	-7,2 [- 29,0; 21,3]		
Не принимающие статины	52,6‰	-3,2 [- 4,4; - 2,0]*	1999– 2001	14,1 [- 33,8; 11,6]	2001– 2013	- 2,3 [- 3,8; - 0,8]*
50–59	37,3‰	-1,8 [- 6,7; 3,3]	1999– 2013	1,8 [- 6,7; 3,3]		
60–79	51,7‰	-3,2 [- 4,6; - 1,7]*	1999– 2013	-3,2 [- 4,6; - 1,7]*		
80+	64,2‰	-3,4 [- 5,0; - 1,8]*	1999– 2013	-3,4 [- 5,0; - 1,8]*		

* $p < 0,05$, ^aданные за 1999–2000 гг. были исключены из-за малого размера выборки ($N < 100$), ^bданные за 1999–2003 гг. были исключены из-за малого размера выборки ($N < 100$), СВЗ – стандартизированная по возрасту заболеваемость, СГПИ – среднее годовое процентное изменение, ГПИ – годовое процентное изменение.