

Таблица 4. Скорректированные^а отношения рисков смертности от ССЗ и КН, по группам клинически значимых отклонений на ЭКГ, их выраженности и пола пациентов

Отклонения на ЭКГ	Смертность от ССЗ				Смертность от КН			
	Муж. <i>n</i> = 281		Жен. <i>n</i> = 167		Муж. <i>n</i> = 172		Жен. <i>n</i> = 96	
	ОР (95% ДИ)	Значение <i>p</i>	ОР (95% ДИ)	Значение <i>p</i>	ОР (95% ДИ)	Значение <i>p</i>	ОР (95% ДИ)	Значение <i>p</i>
Незнач. или отсутствуют	1,0	–	1,0	–	1,0	–	1,0	–
ИБС	2,50 (1,67–3,74)	< 0,001	1,51 (1,00–2,27)	0,048	2,00 (1,14–3,51)	0,016	1,67 (0,99–2,82)	0,053
ГЛЖ	1,65 (0,94–2,91)	0,082	1,19 (0,52–2,72)	0,686	1,58 (0,77–3,25)	0,211	1,09 (0,34–3,50)	0,885
Подтвержденный ИМ	4,40 (2,30–8,42)	< 0,001	2,56 (1,03–6,35)	0,042	4,83 (2,21–10,55)	< 0,001	3,04 (0,94–9,86)	0,064
	(2,30–8,42)		(1,03–6,35)		(2,21–10,55)		(0,94–9,86)	
Предположительный ИМ	1,94 (0,48–7,91)	0,355	3,75 (0,50–27,93)	0,197	2,83 (0,68–11,68)	0,151	6,81 (0,88–52,76)	0,066

^а – с учетом возраста, образования, наличия артериальной гипертензии, уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, холестерина липопротеинов низкой плотности, индекса массы тела, курения, номера исследования. ДИ – доверительный интервал, КН – коронарная недостаточность, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, ЭКГ – электрокардиограмма, ОР – отношение рисков, МИ – инфаркт миокарда, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка.

Статистические значимые значения выделены жирным шрифтом.