

Таблица 4. Характеристики пациентов по вторичной профилактике

Показатели	1999	2013	Возрастная группа в 2013 году								
	Всего (n=4007)	Всего (n=6295)	50–59 лет (n = 1077)			60–79 лет (n = 3211)			80+ лет (n = 2077)		
	п (%) или медиана [P25; P75]	п (%) или медиана [P25; P75]	п (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^а %	Применение статинов эт. кат. ^б %	п (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^а %	Применение статинов эт. кат. ^б %	п (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^а %	Применение статинов эт. кат. ^б %
Применение статинов, n (%)	295 (7,4)	2477 (39,3)	330 (32,8)			1614 (50,3)			533 (25,7)		
Исходные характеристики											
Возраст (годы), медиана (МКР)	73 [66; 79]	74 [64; 82]	55 [52; 57]			70 [65; 75]			85 [82; 89]		
Женщины, n (%)	1839 (45,9)	2871 (45,6)	448 (44,5)	24,1***	39,7	1280 (39,9)	41,6***	56,0	1143 (55)	20,4***	32,1
Определение ЛПНП, n (%)	1559 (38,9)	2405 (38,2)	421 (42,0)	23,3***	39,6	1040 (32,4)	38,8***	55,8	944 (45,5)	14,6***	34,9
ССЗ в анамнезе											
ИМ, % (n)	848 (21,2)	1507 (23,9)	331 (32,9)	36,3*	31,1	786 (24,5)	59,0***	47,4	390 (18,8)	31,0**	24,4
Инсульт, n (%)	831 (20,7)	1496 (23,8)	248 (24,6)	29,8	33,7	672 (20,9)	46,3**	51,3	576 (27,7)	20,5***	27,6
ТИА, n (%)	631	963	67 (6,7)	41,8	32,1	414	49,3	50,4	482	21,8**	26,8

Показатели	1999	2013	Возрастная группа в 2013 году								
	Всего (n=4007)	Всего (n=6295)	50–59 лет (n = 1077)			60–79 лет (n = 3211)			80+ лет (n = 2077)		
	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %
	(15,7)	(15,3)				(12,9)			(23,2)		
ИБС без стенокардии, n (%)	754 (18,8)	1147 (18,2)	144 (14,3)	42,4**	31,2	648 (20,2)	61,3***	47,5	355 (17,1)	33,2***	24,1
ИБС со стенокардией, n (%)	1582 (39,5)	1809 (28,7)	173 (17,2)	46,8***	29,9	938 (29,2)	54,1**	48,7	698 (33,6)	27,5	24,7
ЗПА, n (%)	1011 (25,2)	1669 (26,5)	242 (24,0)	27,3**	34,5	873 (27,2)	45,9**	51,9	554 (26,7)	27,4	25,0
Сопутствующие заболевания											
Фибрилляция предсердий, n (%)	430 (10,7)	870 (13,8)	24 (2,4)	45,8	32,5	359 (11,2)	53,8	49,8	487 (23,4)	21,1**	27,0
Гиперхолестеринемия, n (%)	1040 (26,0)	2075 (33,0)	292 (29,0)	50,7***	25,5	1134 (35,3)	60,6***	44,6	649 (31,2)	34,2***	21,8
Артериальная гипертензия, n (%)	1396 (34,8)	2772 (44,0)	344 (34,2)	36,6*	30,8	1422 (44,3)	51,7	49,1	1006 (48,4)	24,8	26,5
Психические расстройства, n (%)	625 (15,6)	1310 (20,8)	289 (28,7)	32,5	32,9	627 (19,5)	45,1**	51,5	394 (19,0)	17,5***	27,6

Показатели	1999	2013	Возрастная группа в 2013 году								
	Всего (n=4007)	Всего (n=6295)	50–59 лет (n = 1077)			60–79 лет (n = 3211)			80+ лет (n = 2077)		
	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %
Сопутствующие лекарственные препараты											
Аспирин и антигипертензивные препараты											
Аспирин + препараты, влияющие на РАС, и Препараты, не влияющие на РАС	75 (1,9)	707 (11,2)	88 (8,7)	Эт. кат.		458 (14,3)	Эт. кат.		161 (7,8)	Эт. кат.	
Аспирин + препараты, влияющие на РАС, или Препараты, не влияющие на РАС, n (%)	295 (7,4)	1464 (23,3)	171 (17,0)	73,5	80,7	959 (29,9)	73,7**	81,0	334 (16,1)	63,0**	70,8
Только аспирин, n (%)	68 (1,7)	226 (3,6)	45 (4,5)	68,9	80,7	147 (4,6)	58,5***	81,0	34 (1,6)	44,1***	70,8
Препараты, влияющие на РАС, или препараты, не влияющие на РАС, без аспирина, n (%)	702 (17,5)	1808 (28,7)	256 (25,4)	38,7***	80,7	1014 (31,6)	60,4***	81,0	538 (25,9)	44,8***	70,8
Ни одна из этих 3 категорий, n (%)	2942 (73,4)	2797 (44,4)	535 (53,1)	12,7***	80,7	1091 (34,0)	16,1***	81,0	1171 (56,4)	4,6***	70,8

Показатели	1999	2013	Возрастная группа в 2013 году								
	Всего (n=4007)	Всего (n=6295)	50–59 лет (n = 1077)			60–79 лет (n = 3211)			80+ лет (n = 2077)		
	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %
Другие гиполипидемические препараты	73 (4,3)	237 (3,8)	37 (3,7)	48,6**	32,2	164 (5,1)	43,3*	50,6	36 (1,7)	30,6	25,6
Индекс коморбидности Charlson											
МИКЧ ^c , медиана [МКР]	5 [3; 6]	5 [4; 7]	3 [2; 4]			5 [4; 6]			7 [6; 8]		
ИМ/ ИБС без стенокардии, n (%)	1395 (34,8)	2364 (37,6)	442 (43,9)	36,4**	29,9	1269 (39,5)	59,3***	44,3	653 (31,4)	32,3***	22,6
Сердечная недостаточность, n (%)	364 (9,1)	500 (7,9)	20 (2,0)	55,0**	32,3	156 (4,9)	59,6**	49,8	324 (15,6)	19,1**	26,9
ЗПА, n (%)	1011 (25,2)	1669 (26,5)	242 (24,0)	27,3**	34,5	873 (27,2)	45,9**	51,9	554 (26,7)	27,4	25,0
ТИА/инсульт, n (%)	1333 (33,3)	2283 (36,3)	305 (30,3)	31,8	33,2	1014 (31,6)	46,6**	51,9	964 (46,4)	21,1***	29,6
Деменция, n (%)	94 (2,3)	301 (4,8)	17 (1,7)	23,5	32,9	87 (2,7)	40,2*	50,5	197 (9,5)	14,7***	26,8
ХОБЛ/астма, n (%)	579 (14,4)	1580 (25,1)	276 (27,4)	31,9	33,1	862 (26,8)	48,4	51,0	442 (21,3)	24,7	25,9

Показатели	1999	2013	Возрастная группа в 2013 году								
	Всего (n=4007)	Всего (n=6295)	50–59 лет (n = 1077)			60–79 лет (n = 3211)			80+ лет (n = 2077)		
	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %
Язва ЖКТ, n (%)	471 (11,8)	647 (10,3)	65 (6,5)	30,8	32,9	331 (10,3)	49,5	50,3	251 (12,1)	21,9	26,2
Патология печени, n (%)	110 (2,7)	361 (5,7)	52 (5,2)	40,4	32,4	200 (6,2)	48,0	50,4	109 (5,2)	20,2	26,0
Сахарный диабет, n (%)	644 (16,1)	1587 (25,2)	235 (23,3)	38,7**	31,0	855 (26,6)	58,9***	47,1	497 (23,9)	27,4	25,1
Паралич, n (%)	122 (3,0)	141 (2,2)	18 (1,8)	55,6**	32,4	65 (2,0)	43,1	50,4	58 (2,8)	15.5*	26,0
Онкологическое заболевание, n (%)	382 (9,5)	1207 (19,2)	191 (19,0)	20,9***	35,5	631 (19,7)	43,3***	52,0	385 (18,5)	23,4	26,2
Лейкемия, n (%)	9 (0,2)	40 (0,6)	10 (1,0)	20,0	32,9	15 (0,5)	46,7	50,3	15 (0,7)	33,3	25,6
Лимфома Ходжкина, n (%)	12 (0,3)	44 (0,7)	6 (0,6)	16,7	32,9	27 (0,8)	40,7	50,3	11 (0,5)	36,4	25,6
ВИЧ-инфекция/СПИД, n (%)	Н/п	Н/п	Н/п								
Почечная недостаточность ^d , n (%)											
Да против нет	468 (11,7)	665 (10,6)	14 (1,4)	50,0	37,7	192 (6,0)	49,5	54,6	459 (22,1)	25,3**	31,9
Не определяли	755 (18,8)	970	214	13,6***	38,0	372	19,6***	54,3	384	6,0***	30,1

Показатели		1999	2013	Возрастная группа в 2013 году								
		Всего (n=4007)	Всего (n=6295)	50–59 лет (n = 1077)			60–79 лет (n = 3211)			80+ лет (n = 2077)		
		n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %	n (%) или медиана [P25; P75]	Применение статинов кат. ^a %	Применение статинов эт. кат. ^b %
против			(15,4)	(21,3)			(11,6)			(18,5)		
определяли												

МКР – межквартильный размах, ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ССЗ – сердечно-сосудистое заболевание, ИМ – инфаркт миокарда, ТИА – транзиторная ишемическая атака, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ЗПА – заболевание периферических артерий, РАС – ренин-ангиотензиновая система, мИКЧ – модифицированный индекс коморбидности Charlson, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт (двенадцатиперстная кишка или желудок).

**** $p < 0,001$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$ (p-значения получены из простой логистической регрессионной модели).*

^aПрименение статинов кат.: применение статинов в категории интереса; ^bПрименение статинов эт. кат.: применение статинов в эталонной категории; ^cОтсутствие функции почек рассматривается как 0 баллов; ^dесли уровень креатинина определяли за последние 3 года, было взято последнее значение. pСКФ вычисляли по формуле MDRD и, если pСКФ < 45 = > почечная недостаточность.