

Таблица 5. Определяющие факторы применения статинов для вторичной профилактики (логистическая регрессионная модель со смешанным эффектом)

Показатели	Многофакторный анализ (50–59 лет)		Многофакторный анализ (60–79 лет)		Многофакторный анализ (80+ лет)	
	ОШ [95% ДИ]	p-значение	ОШ (95% ДИ)	p-значение	ОШ (95% ДИ)	p-значение
Исходные характеристики						
Возраст, повышение за год			1,25 [1,02; 1,52]	0,030	0,87 (0,84; 0,90)	<0,001
Женщины	0,59 [0,42; 0,84]	0,003	0,64 [0,54; 0,77]	<0,001	0,68 [0,51; 0,89]	0,005
Определение ЛПНП			0,64 [0,49; 0,83]	0,001	0,50 [0,37; 0,68]	<0,001
ССЗ в анамнезе						
ИМ			1,42 [1,15; 1,75]	0,001		
ИБС без стенокардии			1,40 [1,12; 1,75]	0,003	1,48 [1,06; 2,09]	0,022
ИБС со стенокардией	1,60 (1,04; 2,45)	0,030			1,36 (1,03; 1,80)	0,033
Сопутствующие заболевания						
Фибрилляция предсердий					0,66 [0,48; 0,92]	0,013
Гиперхолестеринемия	3,59 [2,45; 5,30]	<0,001	2,40 [1,98; 2,92]	<0,001	2,93 [2,18; 3,97]	<0,001
Артериальная	0,65	0,030	0,58	<0,001	0,65	0,002

Показатели	Многофакторный анализ (50–59 лет)		Многофакторный анализ (60–79 лет)		Многофакторный анализ (80+ лет)	
	ОШ [95% ДИ]	p-значение	ОШ (95% ДИ)	p-значение	ОШ (95% ДИ)	p-значение
гипертензия	[0,44; 0,96]		[0,48; 0,70]		[2,18; 3,97]	
Психические расстройства					0,63 [0,43; 0,91]	0,015
Сопутствующие лекарственные препараты						
Аспирин и антигипертензивные препараты						
Препарат сравнения: Аспирин + препараты, влияющие на РАС, и	1,00		1,00		1,00	
Препараты, не влияющие на РАС						
Аспирин + препараты, влияющие на РАС, или препараты, не влияющие на РАС	0,63 [0,28; 1,35]	0,236	0,61 [0,44; 0,85]	0,004	0,67 [0,40; 1,12]	0,126
Только аспирин	0,48 [0,19; 1,19]	0,110	0,23 [0,15; 0,36]	<0,001	0,30 [0,13; 0,71]	0,006
Препараты, влияющие на РАС, или препараты, не влияющие на РАС	0,15 [0,08; 0,28]	<0,001	0,36 [0,27; 0,47]	<0,001	0,37 [0,24; 0,57]	<0,001
Ни одна из этих 3 категорий	0,03 [0,01; 0,06]	<0,001	0,04 [0,03; 0,05]	<0,001	0,02 [0,01; 0,03]	<0,001
Другой гипопиридемический препарат	0,39 [0,17; 0,88]	0,024	0,24 [0,17; 0,35]	<0,001	0,19 [0,08; 0,42]	<0,001
Индекс коморбидности Charlson						

Показатели	Многофакторный анализ (50–59 лет)		Многофакторный анализ (60–79 лет)		Многофакторный анализ (80+ лет)	
	ОШ [95% ДИ]	p-значение	ОШ (95% ДИ)	p-значение	ОШ (95% ДИ)	p-значение
МИКЧ ^a			0,89 [0,83; 0,95]	<0,001		
Патология печени					0,54 [0,28; 1,00]	0,054
Сахарный диабет			1,52 [1,22; 1,88]	<0,001		
Паралич	5,12 [1,51; 17,60]	0,009				
Онкологическое заболевание	0,63 [0,39; 1,01]	0,059				
Почечная недостаточность						
Да	1,88 [0,53; 6,60]	0,318	0,98 [0,65; 1,46]	0,904		
Не определяли	0,34 [0,20; 0,55]	<0,001	0,39 [0,27; 0,55]	<0,001		

ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ССЗ – сердечно-сосудистое заболевание, ИМ – инфаркт миокарда, ИБС – ишемическая болезнь сердца, РАС – ренин-ангиотензиновая система, МИКЧ – модифицированный индекс коморбидности Charlson.

^aОтсутствие функции почек рассматривалось как 0 баллов.