

	Группа без заслепления результатов		Группа с заслеплением результатов	
	Количество в цикле 2 (% от цикла 1)	Всего в цикле 1	Количество в цикле 2 (% от цикла 1)	Всего в цикле 1
Возрастная группа (лет)				
20-24	1059 (54,8)	1933	343 (53,4)	642
25-29	1094 (56,2)	1946	363 (56,3)	645
30-39	3711 (64,8)	5725	1223 (64,7)	1889
40-49	3265 (71,0)	4601	1055 (69,6)	1516
50-64	2967(71,0)	4181	1000 (69,8)	1432
Цитологическое исследование				
Отрицательно	10391 (64,8)	16042	3417 (64,0)	5338
Пограничный результат (ASCUS)	965 (71,9)	1343	323 (72,4)	446
Легкая степень (LSIL)	470 (73,1)	643	170 (72,3)	235
Средняя степень* (HSIL)	270 (75,4)	358	74 (70,5)	105
Исследование на ВПЧ				
Отрицательно	10231 (65,9)	15526	3373 (65,2)	5171
Положительно	1865 (65,2)	2860	611 (64,1)	953
Всего	12096(65,8)	18386	3984 (65,1)	6124

ASCUS = атипичные клетками неопределенной значимости. HSIL = высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения. LSIL = низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения. Цикл 2 определяется как первый цитологически адекватный образец для ЖЦ, полученный через 26-54 месяца после включения в цикл 1. Включает 90 женщин, у которой образец в цикле 2 был цитологически неадекватным, и 448 женщин, которые пришли на цикл 2, но имели гистологическую картину, соответствующую CIN2+, и получавшие лечение в цикле 1.