

ТАБЛИЦА 1 Исходные демографические показатели и результаты одномерного логистического регрессионного анализа					
	Без истмоцеле, n = 202 (54,4%)	С истмоцеле, n 169 (45,6%)	ОШ	95% ДИ	P- значение
Возраст матери, среднее (СО), годы	32,1 (5,6)	33,1 (4,9)	1,04	1,00-1,08	0,074
Гестационный возраст, среднее (СО), нед.+д.	39+2 (2,5)	39+2 (2,2)	1	0,92-1,09	0,947
Роды в анамнезе, среднее (диапазон)	0 (0-6)	1 (0-5)	1,54	1,22-1,93	0,001
Вагинальные роды в анамнезе, n (%)	35 (17,3)	23(13,6)	0,75	0,43-1,33	0,327
КС в анамнезе CD, n (%)	38 (18,8)	79 (46,7)	3,69	2,38-6,03	<0,001
Показание к КС, n (%)					
Плановое	85 (42,1)	70(41,4)			0,898
Экстренное	117(57,9)	99 (58,6)	1,03	0,68-1,56	
Масса тела при рождении, среднее (СО), г ^a	3532 (705)	3595(610)	1,02	0,98-1,05	0,375
Курение в период беременности, n (%)	9 (4,5)	6 (3,6)	0,79	0,28-2,26	0,660
Гестационный сахарный диабет, n (%)	49 (24,3)	66 (39,1)	2,00	1,28-3,12	0,002
Сахарный диабет, n (%)	6 (3,0)	6 (3,6)	1,20	0,38-3,80	0,753
ИМТ до беременности, среднее (СО), кг/м ²	25,1 (5,3)	27,1 (6,1)	1,07	1,03-1,11	0,001
ИМТ на момент КС, среднее (СО), кг/м ²	30,4 (5,3)	32,3 (5,9)	1,06	1,02-1,10	0,002
Изменение массы тела матери, среднее (СО), кг	14,3(6,2)	13,4 (6,0)	0,98	0,94-1,01	0,159
Положение матки по данным УЗИ, n (%)					
Антеверсия	149(73,8)	108(64,3)			0,049
Ретроверсия	53 (26,2)	60 (35,7)	1,56	1,00-2,44	
Раскрытие шейки матки на момент КС, n (%), см					
0	95 (47,0)	82 (48,5)			0,071
1-4	62 (30,7)	36 (21,3)	0,67	0,41-1,12	0,125
>5	45 (22,3)	51 (30,2)	1,31	0,80-2,16	0,284
Инфекция в родах или в послеоперационном периоде, n (%)	26 (12,9)	33 (19,5)	1,64	0,94-2,88	0,083
Опыт хирурга, n (%)					
Ординатор	133 (65,8)	110(65,1)			0,879
Специалист	69 (34,2)	59 (34,9)	1,03	0,67-1,59	
Стимулирование родов, n (%) ^b	59 (29,2)	38 (22,5)	0,63	0,37-1,10	0,103
Многоплодная беременность, n (%)	12 (5,9)	8 (4,7)	0,79	0,31-1,97	0,609
Преэклампсия, n (%)	15 (7,4)	8 (4,7)	0,62	0,26-1,50	0,288
Кортикостероиды в антенатальном периоде, n (%)	16(7,9)	10(5,9)	0,73	0,32-1,66	0,453
Длительность родов, среднее (СО), ч ^b	13,9(6,7)	16,2 (7,6)	1,05	1,00-1,10	0,039
Добавление окситоцина во время родов, n (%) ^b	70 (59,8)	68 (68,7)	1,00	0,99-1,01	0,530
Безуспешное применение вакуума для родоразрешения перед КС, n (%) ^b	8 (6,8)	5(5,1)	0,73	0,23-2,29	0,584
Положение предлежащей части, n (%) ^b					
На уровне или выше входа в малый таз	105 (48,8)	85 (39,5)			0,494
Ниже входа в малый таз	12 (5,6)	13 (6,0)	1,34	0,58-3,09	
ИМТ - индекс массы тела; КС - кесарево сечение; ДИ - доверительный интервал; ОШ - отношение шансов. ^a случаи многоплодной беременности исключены; ^b в подгруппе экстренного КС					
Antila-Långsjö et al. Risk factors for postcesarean isthmocele. Am J Obstet Gynecol 2018.					