

Таблица 1. Характеристики участников-мужчин, сгруппированных по уровням мочевой кислоты в сыворотке крови

	Квартиль по уровню мочевой кислоты сыворотки				Р-значение тренда
	1-й (нижний)	2-й	3-й	4-й (верхний)	
Мужчины (<i>n</i> = 321)					
Количество участников	78	84	78	81	
Мочевая кислота сыворотки крови (мг/дл)	≤5,0	5,1–5,9	6,0–6,6	≤6,7	
рСКФ (мл/мин/1,73 м ²), среднее значение (СО)	88,7 (13,9)	88,3 (13,7)	84,4 (13,0)	82,5 (13,6)	0,001
Возраст (лет), среднее значение (СО)	62,7 (7,9)	60,2 (9,1)	59,9 (9,0)	60,3 (9,4)	0,103
ИМТ (кг/м ² , среднее значение (СО)	21,7 (2,4)	22,4 (2,4)	22,8 (2,5)	24,0 (2,7)	< 0,001
САД, (мм рт. ст.), среднее значение (СО)	120 (18)	121 (17)	123 (16)	127 (17)	0,007
ДАД, (мм рт. ст.), среднее значение (СО)	75 (9)	76 (10)	79 (10)	81 (11)	< 0,001
НbA1c (%), среднее значение (СО)	5,5 (0,5)	5,7 (0,8)	5,5 (0,5)	5,5 (0,4)	0,273
ЛПВП-ХС (мг/дл), среднее значение (СО)	63 (14)	61 (14)	60 (15)	60 (14)	0,137
ЛПНП-ХС (мг/дл), среднее значение (СО)	118 (28)	125 (27)	131 (26)	122 (25)	0,180
ТГ (мг/дл), медиана (МКР)	68 (49, 92)	78 (58, 107)	98 (64, 120)	107 (74, 157)	< 0,001
Курит в настоящее	8 (10)	14	5 (6)	6 (7)	0,201

	Квартиль по уровню мочево́й кислоты сыворотки				Р-значение тренда
	1-й (нижний)	2-й	3-й	4-й (верхний)	
время, n (%)		(17)			
Злоупотребляет алкоголем в настоящее время, n (%)	53 (68)	61 (73)	62 (79)	71 (88)	0,002
Потребление алкоголя в настоящее время, этанол (г/сут) ^a , медиана (МКР)	20 (6, 20)	14 (10, 36)	20 (9, 42)	23 (12, 49)	0,144
Расчетное потребление соли, г/сут (СО)	8,9 (1,9)	9,0 (1,9)	8,7 (2,0)	9,0 (1,9)	0,987

*p*СКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации, ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЛПВП-ХС – холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПНП-ХС – холестерин липопротеинов низкой плотности, ТГ – триглицериды, МКР – межквартильный размах. ^aВ настоящее время только злоупотребляет алкоголем.